

CATALOGUE HOLLANDOISE
TANT DES
ARBRES ET PLANTES
ETRANGERES,
QUE DES
RACINES ET OIGNONS
A FLEURS,

Qu'on vend au plus bas prix chez

W. VAN HAZEN,
H. VALKENBURGH,
ET COMP.

Fleuristes sur le Marendyk à Leyden en Hollande.

SECONDE EDITION,

Où on trouve aussi notées les noms communes qui
portent les Arbres & Plantes, en France
& en Angletterre.

TER BOEKDRUKKERYE,
Van VAN DAMME.

Rare 8Bf 3375²

E X P L I C A T I O N Des Lettres & Marques de la Premiere Colonne regardant leur habitude.

- A. 1. Signifie Arbres qui croissent les plus hautes.
A. 2. - - - - - du second rang.
A. 3. - - - - - du troisieme ordre.
A. 4. - - - - - du quatrieme ou plus bas rang.
F. - - - Arbrisseaux.
V. - - - Plantes grimpantes.
P. $\frac{1}{2}$ - - - - - poussants leur tieges ou verdures seule-
ment à un demie pied d'hauteur.
P. 1. - - - - - croissant environ un pied d'hauteur.
P. 2. - - - - - qui poussent leur tieges ou verdure, en-
P. 3. - - - } viron deux, trois, quatre, &c. pieds, pendant
P. 4. &c. } l'Eté.
B. $\frac{1}{2}$ - - - Oignons poussant leur tieges environ un demie pied.
B. 1. - - - } Croissant Jusq'à un, deux &c. pieds
B. 2. &c. } d'hauteur.
R. $\frac{1}{2}$ - - - Racines, ou Pates, perdant leur verdure en hyver
se levent environ l'hauteur d'un demie pied.
R. 1. - - - Racines, ou Pates, croissant Jusq'à, un deux &c.
R. 2. &c. - - - pieds.

Les marques du zodiacq signifient environ le tems dans le
quel ils fleurissent. Comme

- ♈ Fait connoitre qu'ils fleurissent, en Janvier.
♉ - - - - - Fevrier.
♊ - - - - - Mars.
♋ - - - - - Avril.
♌ - - - - - May.
♍ - - - - - Juin.
♎ - - - - - Juillet.
♏ - - - - - Aout.
♐ - - - - - Septemb.
♑ - - - - - Octob.
♒ - - - - - Novembr.
♓ - - - - - Decembr.
♊ + - - - - de Juillet jusqu'à Novembr. &c.
♈ Signifie qu'ils fleurissent tout l'Eté ou bien la plus grande
partie de l'Année.
† Signifie qu'ils portent de belles fleurs.

E X



EXPLICATION

*Des Caractères de la Seconde Colonne Regardant
leur traitement ou leur Culture.*

- a. Fait connoître, Celles qui restent en grand air, ou en pleine terre sans aucune Couverture.
- b. Signifie, Celles qui restent en pleine terre, étant couvertes, de paille, de nattes, ou feuilles seches pendant l'Hyver.
- c. — — qui peuvent être conservées dans une serre sans feu étant seulement gardées de la gelée.
- d. — — qui restent aussi dans une serre sans feu, mais qui doivent être posées près de fenêtres, ou dans un Lieu où ils peuvent recevoir le soleil & plus d'air frais.
- e. — — qui doivent être conservées dans une serre un peu Rechauffée.
- f. — — qui ont besoin la même Chaleur que les Ananasses.
- g. — — qui doivent avoir la plus grande Chaleur.
- o. — — Celles qui doivent rester toute l'année dans les serres, ne pouvant souffrir l'inconstance de notre Climat.
- x. — — qui ont besoin d'être mise au printemps, dans une serre remplie de tan pour les faire Croître.
- f. — — Celles à qui on doit donner très peu de l'eau pendant l'Hyver.
- ff. — — Celles à qui on ne doit pas absolument donner de l'eau pendant l'Hyver.
- * — — Plantes ou oignons d'Afrique qui étant plantés dans une Planche en pleine terre couverts avec de verres pendant l'Hyver & bien gardées pour toute gelée, croissent plus fort & fleurissent plus volontiers que quand ils sont plantés dans des pots & mis en les serres.

LES LETTRES

*Qui se trouvent derriere les noms
denotent.*

B. Boerhave, index alter Plantarum, Lugduni Batavorum, apud P. van der Aa, 1720

R. A. van Royen flore Leydenfis Prodrornus Lugduni Batavorum, apud S. Luchrmans, 1740

L. C. Linnæi, species Plantarum, Holmiæ, 1753

M. P. Miller Gardeners dictionary Sixth edition, London 1752

T. Z. J. Burmanni Thesaurus Zeylanicus, Amstelædami 1737

B. D. J. Burmanni Decades plantarum africanarum Amstelædami, 1738

T. Tournefort, Institutiones rei Herbariæ, Paris 1719

C. C. Commelinus, icones Plantarum Lugduni Batavorum, 1716

C. H. Horti Cliffortiani.

Ou on trouve ces Plantes aux nombres
qui y sont ajoutes.

C A.

C A T A L O G U E

D E S

ARBRES ET PLANTES

ETRANGERES.

ABIES, en Francois, *Sapin*; English, *Fir tree*.

Habitus

Cultuure

- | | | |
|-------|----|---|
| A. 1. | a. | 1. Taxi fol. Subtus argenteis, <i>picea alba</i> Vulgo B. 1. <i>pinus</i> L. 8. |
| A. 1. | a. | 2. <i>tenuiore</i> B. 2, <i>picea rubra dicta</i> <i>pinus</i> L. 10. |
| A. 1. | a. | 3. <i>odoræ balsami gileadensis</i> M. 7. <i>pinus</i> L. 9. |
| A. 1. | a. | 4. Virg. fol. <i>tenuiore odorato</i> , <i>pinus am. conis minimus</i> . |
| A. 1. | b. | 5. Fol. fasciculatis R. 3. <i>larix orientale</i> B. 2. T. <i>pinus</i> L. 6. <i>Cedrus Libani</i> Vulgo. |
| A. 1. | c. | 6. Afr. fol. <i>Cæseis</i> , <i>pinus afr. Conis nigro maximo</i> . |
| A. 1. | c. | 7. Eadem <i>Conis minori</i> . |
| A. 3. | a. | 8. Minor virg. <i>pectinatis fol. Conis parvis subrotundis</i> M. 3. |
| A. 1. | a. | 9. <i>Picea fol. brevioribus Conis minimus</i> M. 5. |
| A. 1. | a. | 10. <i>parvis biancialibus</i> M. 6. |

A B R U S.

- V. g. o. 1. R. pag. 534. *Glycine* L. 5.

ABSINTIUM, François, *Absinthe*; English, *Worm-wood*.

- A. 4. 2. c. 1. Orient. frutesc. in canum amplo fol. tenuissimo, diviso, B. 2. *artemisia* L. 1.

A 3

a. Po

2 Catalogue des Arbres & Plantes Etrangères.

Habitus Cultuure

- P. 2. m a. 2. Ponticum B. 3. *artemisia* R. LL. 2.
P. 2. m a. 3. tenui fol. incanum B. 7. *artemisia* R. 3. L. 9.

ACACIA Fr. Casie, Eng. *Egyptianthorn*.

- A. 1. Ω a. 1. Amer. abruæ fol. spinis triplici donato B. 8. *gleditsia* L. 1.
A. 1. Ω a. 2. triacanthos, capsula ovali M. 2. *gleditsia* L. 2.
A. 4. $\text{m} + \text{c}$. 3. Afr. fol. parvis duplicato pinnato flore luteo globoso odorato.
A. 4. $\text{m} + \text{c}$. 4. Vera fl. luteo odorato B. 1. *mimosa* R. 8. L. 31.
A. 2. c. 5. Ægyptiaca fl. albo, *mimosa* R. 3.
A. 3. e. o. x. 6. Amer. fol. amplissimo duplicato pinnato non spinoso.
F. m c. o. 7. non Spinosa, fol. tenuiss. fl. globoso albo M. 16.
A. 2. m c. o. 8. flore globoso albo M. 13. *mimosa* R. 13.
A. 3. e. o. x. 9. Similis mexicana, spinis Cornibus similis B. 4. *mimosa* R. 2. L. 36.
A. 2. c. 10. Uti No. 5. flore Luteo, *mimosa* L. 21.

ACANTHUS, Fr. *Acante*, Eng. *Bear'sbreech*.

- P. 1. $\text{S} + \text{b}$. 1. Sativus R. & L. 1.
P. 1. $\text{S} + \text{b}$. 2. Rarioribus & brevioribus aculeis muaitis B. 2.
P. 1. b. 3. Fol. pinnatis aculeatis R. & L. 2.

ACER, Fr. *Erable*, Eng. *Maple*.

- A. 1. a. 1. Platanoides fol. Eleg. Varieq. M. 8.
A. 1. a. 2. Virgin. fol. trifidis & quinquifidis B. 5. L. 9.
A. 1. a. 3. Fol. palmatis om. max. Caule rubente M. 9. *opalus italarum*.
A. 2. a. 4. Amer. Sacharifera L. 4.
5. Pla.

Catalogue des Arbres & Plantes Etrangères.

3

Habitus Cultuure

- | | | |
|-------|----|--|
| A. 1. | a. | 5. Platanoides, L. 5. |
| A. 2. | a. | 6. Amer. fol. subtus arg. floribus multis, coc-
cineis, L. 3. |
| A. 1. | a. | 7. Majus fol. Eleg. Variegato, M. 2. |
| A. 2. | a. | 8. Virg. fol. majoribus subtus argenteis viri-
dis splendoro, M. 4. |

ACHILLEA, Fr. Mille-feuille, Eng. Milfoil.

- | | |
|----------------|--|
| P. 2. Ω → + a. | 1. Fol. Eleg. Varieg. millifolium, B. 15. |
| P. 2. Ω → + a. | 2. . . pinnato fl. rubro, L. 14. B. |
| P. 1. Ω → + a. | 3. . . pinnatifidis Villosis fl. aureo, L. 4. R.
2. millifolium tomentosum, B. 9. |
| P. 2. Ω → + b. | 4. . . pinnatis duplicatis fl. aureo, millifoli-
um, B. 7. |
| P. 2. Ω → + b. | 5. Eadem fl. Sulphureo, millifolium, B. 8. |
| P. 1. Ω → + b. | 6. Fol. pinnatis fl. aureo, R. 6. |
| P. 1. Ω → + b. | 7. foliolis ovatis, R. 12. L. 17. |
| P. 1. Ω → + a. | 8. . . lanceolatis, R. 10. L. 2. ageratum odo-
raturum, B. 2. |
| P. 2. Ω → + a. | 9. . . integris, R. 7. L. 10. ptermica, B. 1. |
| P. 2. Ω → + a. | 10. fl. pleno, L. 10. β. ptermica,
B. 2. |
| P. 2. Ω → + b. | 11. . . planis villosis nitidis, R. & L. 9. |
| P. 1. Ω → + a. | 12. . . lanceolatis dentatis, R. 8. ptermica, B. 6. |
| P. 4. Ω → + a. | 13. Maxima umbella alba, L. 11. |
| P. 1. Ω → + c. | 14. Duplicato pinnato tomentoso, R. 12. pter-
mico santoline fol. T. |
| P. 1. Ω → + b. | 15. pinnato L. 6. |
| P. 2. Ω → + a. | 16. fl. albo, L. 14. |

ACHYRANTES.

- | | | |
|------|----|--|
| F. ♂ | e. | 1. Caule erecto, L. 1. amarantus ficulis, B. 15. |
| F. | e. | 2. fol. atro puniceis. |
| F. ♂ | c. | 3. Floribus purpurascens lappæcis, L. 2. |

ACO-

ACONITUM, Fr. *Aconit ou Casque*, Eng. *Wolf's bané*.

B. ∞ +	a.	1. Hyemale <i>M. belleborus</i> , R. 4. L. 1.
P. 3. ∞	a.	2. <i>Lycostonum luteum</i> , R. & L. 1.
P. 3. ∞	a.	3. <i>Luteum majus ampliore Caule</i> , B. 2.
P. 5. ∞ +	a.	4. <i>Cæruleum</i> , B. 5. R. 3.
P. 2. ∞	a.	5. <i>Salutiferum</i> , L. 5.
P. 5. ∞ +	a.	6. Fl. ex <i>Cæruleo</i> & <i>albicante</i> Var. B. 7.
P. 5. ∞ +	a.	7. <i>Cæruleo purp. maximo</i> , L. 3.
P. 5. ∞ +	a.	8. <i>Oblongo flore intensiore Cæruleo</i> .

ACORUS, Fr. *Masse*, Eng. *Sweet rush*.

R. 3. ∞	a.	1. <i>Verus, Calamus aromaticus</i> , L. 1.
----------------	----	---

ACRIVIOLA, Eng. *Indian Crets*.

V. δ +	e.	1. <i>Flöre pleno, tropeolum</i> L.
---------------	----	-------------------------------------

ACTEA, Fr. *Christophoriane*, Eng. *Baneberries*.

P. 2. ∞	a.	1. <i>Caule inermi</i> , L. 4.
P. 5. ∞	a.	2. <i>Racemis longissimus</i> , L. 2.

ADHATODA, Eng. *Mallabar-nut or-snap tree*.

A. 3. ∞	c.	1. Fl. <i>galea Concava</i> B. 1. <i>Justitia</i> , R & L. 1.
A. 4. ∞	e.	2. <i>Folio saligno</i> B. 2. <i>Justitia</i> , R. 2. L. 4.
F. ∞ ω +	e o.	3. <i>Spica longiff. fl. reflexo</i> , T. Z. <i>Justitia</i> L. 2.

ADIANTHUM, Fr. *Capillaire*, Eng. *Maidenhair*.

P. $\frac{1}{2}$.	b.	1. <i>Ramosum pediculis Lucidis & nigris</i> , R. 2. L. 14.
--------------------	----	---

ADONIS, Eng. *Bird's-eye*.

P. 1. ∞ +	a.	1. <i>Hellebori radice bubthalmi flore</i> , L. 2.
------------------	----	--

ÆSCHYNOMENE.

F.	e. o. x.	1. <i>Caule Lævi</i> , R & L. 4.
----	----------	----------------------------------

Catalogue des Arbres & Plantes Etrangères.

Habitus Cultuure

AGRIMONIA, Eng. basterd Agrimony.

P. $\frac{1}{2}$. II a. 1. Fol. caulinis ternatis R & L. 2.

ALATERNOIDES.

A. 4. m + d. 1. Afr. Erice fol. fl. albicante muscoso, mas
B. 1. phyllica R & L. 1.

A. 4. v c. 2. Telephi Legitimi fol. mas, Clusia L. 1.

A. 4. v c. 3. Lauri ferrato folio B. 3. Celastrus R. 3.
Ceanothus L. 3.

A. 4. m + d. 4. Ut No. 1. feminifera.

ALATERNUS, Fr. Alaterne, Eng. Ever-green privet.

A. 3. v b. 1. Hispanica B. 1. mas. Rhamnus R. 8. L. 4.

A. 3. v b. 2. Latefolio ex aureo & Viridi Varieg. B. 2.
M. 2.

A. 4. v b. 3. Minore fol. B. 4. M. 6. phillyrea media
L. syst. natur.

A. 4. v b. 4. Seu phillyrea fol. ex luteis varieg. B. 6.

A. 4. v b. 5. albo var. B. 7.

A. 3. v b. 6. Ut No. 1. femina.

A. 4. v b. 7. Ut No. 3. fol. profundo ferrato M. 3.

ALCEA, Eng. Vervain-mallow.

F. 8 + d. 1. Afr. fol. grossulariae glabra fl. parvo rubro
B. 13. malva R. 3.

F. 8 + d. 2. amplo hirsuto fl. rubro malva
L. 6. p.

F. 8 + d. 3. amplissimo fl. amplo kermosino
M. 8.

P. 2. m + a. 4. Vulgaris major fl. Candiore B. 2. malva
L. 13.

P. 3. m + a. 5. fl. ex rubro roseo B. 2. malva
R. 6.

F. m e. 6. Afr. alnii fol. fl. parvo Luteo.

F. 8 + d. 7. . . . folio amplo hirsuto fl. roseo magno;
malva L. 6. y.

6 *Catalogue des Arbres & Plantes Etrangères.*
Habitus *Culture*

ALCHIMILLA, Fr. *Pié de Lion*, Eng. *Ladies-mantle*.

- P. $\frac{1}{2}$. II \rightarrow a. 1. Alpina pubescens minor B. 2. L. 2. β .
P. $\frac{1}{2}$. II \rightarrow a. 2. Fol. digitatis argentea R & L. 2.
P. $\frac{1}{2}$. II \rightarrow a. 3. . . palmatis L. 1.

ALKEKENGI, Fr. *Coqueret*, Eng. *Winter Cherry*.

- P. I. \rightarrow a. 1. Officinarum B. 1. *physalis* R. 3. L. 5.
P. I. \rightarrow e. 2. Curassav. fl. viete sulphureo fundo purp.
B. 8. *physalis* R. 2. L. 3.
P. I. \rightarrow d. 3. Bonariensis bacca turbinato, *physalis* R &
L. 4.
F. \rightarrow 4. Fruticoso fructu parvo B. 7. *physalis* R &
L. 1.

ALLIUM, Fr. *Ail*, Eng. *Garlick*.

- P. I. \rightarrow a. 1. Montanum fol. narcissi maius umbella pur-
pureo M. 11.
P. I. \rightarrow a. 2. minus umbella pur-
pureo M. 14.
P. 2. \rightarrow a. 3. Sativum alterum L. 10.

A L Ö E.

- P. c.f. 1. Amer. maior, B. 5. R. 1. *agave* L. 1.
P. c.f. 2. fol. ex argenteis striatis.
P. c.f. 3. aureo striato Elegan-
tissimo.
P. e.o.f. 4. sobolifera B. 7. *agave* L. 2.
P. c.f. 5. amer. fol. longissimo & angustissimo
B. 6. ex vera Cruce Maior. M. 4.
P. c.f. 6. fol. glauco spinoso B. 8. M. 3.
ex vera Cruce minor tuberoso.
P. c.f. 7. viridi dicta B. 10. R. 8. *agave*
L. 4.
A. d.f. 8. folio Juccæ arborescens B.
45. *yucca* L. 2.
A. c.f. 9. draconis fol. ferrata B. 11.
Cordyline R. 2. *jucca* L. 3.

10. *Cary*

Catalogue des Arbres & Plantes Etrangères.

7

Habitus	Cultuure	
A.	e.o.f.	10. Americana Cannæ indicæ folio.
P. 3. = +	c.*	11. Africana fol. longiss. & angustiss. fl. luteis B. 43. R. 8. L. 9. <i>iris uvaria</i> Vulgo.
P. 3. = +	c.*	12. Eadem in omni parte maioribus B. 44.
P.	e.o.f.	13. Afr. Caulesc. fol. magis glaucis C. fig. 44.
A.	d.f.	14. . . . glaucis B. 21. <i>aloe arbo-</i> <i>rescens vulgo.</i>
P.	d.f.	15. . . . glaucis breviss. Caulem amplect B. 15.
P. = +	d.f.	16. . . fol. glaucis, margine & dorso supe- rioribus spinosis fl. rubro B. 18.
A.	d.f.	17. . . Caulesc. fol. Crasso obscure viridi, B. 39
A.	d.f.	18. . . eadem, sed in omni parte Crassiori- bus.
A.	d.f.	19. . . Caulesc. fol Crasso brevi obscure viridi.
P.	d.f.	20. . . fol. spinosis in dorso maculis albicantibus notato.
P.	d.o.f.	21. . . fol. magis glaucis Caulem amplecten- tibus in margine & dorso verrucosis.
P. 8 +	d.f.	22. . . breviss. & Crassiss. folio, B. 2. R. 12. L. 6.
P. Ω	e.o.f.	23. . . humilus triang. atro viridis verrucosis.
P. 8 +	d.f.	24. . . spinis inermibus & verrucosis, B. 23.
P. 8 +	d.f.	25. verrucosis, opposita R. 14.
P. 8 +	d.f.	26. . . fol. ex albo & viridi varieg. R. 11. L. 2.
P. Ω	d.f.	27. . . fol. triang. glabro, atro viri- dis ex <i>semen margaritifera</i> degener.
P. 8 +	d.f.	28. . . Caulescens fol. amplexi caulibus in margine & in dorso spinoso fl. amplo rubro
P. 8	e.o.f.	29. . . humilus spinis herbaceis L. 8. δ.
P. =	d.f.	30. . . . margaritifera major, B. 31.
P. =	d.f.	31. media, B. 31.
		B 2 32. Afr.

8 *Catalogue des Arbres & Plantes Etrangères.*

Habitus	Culture	
P. m	d.f.	32. Afr. humilus margaritifera minor, B. 26. L. 8. β .
P. m	d.f.	33. maxima in dorso- solo verrucoso.
P. m	d.f.	34. . . humilus margaritifere minima fol. multo Longioribus B 27. L. 8 y.
P. δ	d.f.	45. . . erecta triangularis & triangulari folio B. 32. R. 10. L. 7.
P. δ	d.f.	36. . . eadem Caule & folio gracilior.
P. $\text{H}+$	d.f.	37. . . erecta rotundi fol. parva, B. 33. R. 9. L. 5.
P. Ω	d.f.	38. . . minima atro viridis spinis herbaceis, B. 40. R. 13. L. 8. ϵ .
P. γ	d.o.f.	39. pallide viridis & non spinosis.
P. $\gamma+$	d.o.f.	40. . . abores: montana plicatili fol. B. 34. L. 3. ϵ .
P. $\text{S}+$	d.f.	41. . . fol. planis Conjugatis Carrinatis ver- rucosis.
P. $\text{S}+$	d.f.	42. . . fol. longis Conjugatis margaritif. fl. ru- bro Eleg. B. 38.
P. $\text{S}+$	d.f.	43. . . fol. planis Conjugatis fl. Corallini Co- lore B 36. L. 3. δ .
P. $\text{S}+$	d.f.	44. . . eadem fol. Eleg. striato.
P. $\text{S}+$	d.f.	45. . . fol. planis Conjug. maculis albicante notato fl. rubro B. 35.
P. $\text{S}+$	d.f.	46. . . fl. rubro, fol. triangulari verrucosis, B. 25. L. 3. β .
P. $\text{S}+$	d.f.	47. maculis albicantibus ab utraque parte notato B 37.
A.	d.o.f.	48. . . arborescens fol. Cylindraceis cinereis margine spinosis.
P. $\text{m}+$	d.f.	49. . . Vulgaris B. 1. R. 3. L. 1. *.
P.	d.f.	50. . . Vulg. similis maior maculis albis pic- ta B. 2.
P. $\text{m}+$	d.f.	51. . . vera minor B. 3. succotrina flore phœni- cæo vulgo L. 1. ξ .
P.	d.f.	52. . . Caballina.
P.	d.f.	53. maior.

54. Zey-

Catalogue des Arbres & Plantes Etrangères.

9

Habitus	Cultuure	
P.	d. f.	54. Zeylanica pumila fol. varieg. B. 42. R. 7. L. 4. æ.
P. = +	f. ff. o.	55. Guëneënsis fol. ex viridi & atro Undulato Var. B. 41. R. 6. L. 4. e.
P. = +	d. f.	56. Afr. Caulescens. fol. amplexi caule, Utriump- que parte Verrucosis & Spinosis, fl. magno rubro.
P. = +	d. f.	57. Afr. humilis spinis inermibus & valde Ver- rucoso fl. rubro, C. fig. 46.
P. Ω	d. f.	58. margaritifera om. minimum fol. acutiss. exeunte.
P. Ω	d. f.	59. media, pallidi viri- dis.
P.	d. f.	60. fol. lingui formi, omnium mi- nimum.
P. Ω +	d. f.	61. latissimo, val- de maculato.
P. Ω +	d. f.	62. obtu- sior ætroviridis splendent.
P.	e. o. f.	63. Americ. sobolifera latifolia maximo, agave
P. = +	d. f.	64. Afr. Erecta, rotundo folio acutissimo exeunte verrucoso.
P.	e. o. f.	65. Amer. minor fol. lucidis viridis, agave.

A L T H E A.

A. 3. Ω + c.	1. Frutescens. bryoniæ fol. B. 7. Malva R. 7. L. 5.
A. 3. Ω + c.	2. Maritima arbor veneta, B. 9. lavatera R. & L. 1.
A. 4. = + a.	3. Vel ketmia Syrorum fl. albo M. 3.
A. 4. = + a.	4. purpureo M. 2.
A. 4. = + a.	5. rubro M. 1.
A. 4. = + a.	6. roseo.
A. 4. = + a.	7. Cæruleo.
A. 4. = + a.	8. ex albo & rubro Va- riis M. 4.
A. 4. = + a.	9. purp. fol. Eleg. Va- rieg. M. 5.

Hibiscus L. 9.

B 3

10. Eruti.

16 Catalogue des Arbres & Plantes Etrangères.

Habitus Culture

A. 4. $\Omega \rightarrow +$ o. 10. Fruticoso fol. cordato integerrimo fl. amplo
roseo *Lavatera* L. 4

A. 4. $\Omega \rightarrow +$ e. 11. . . . fol. quinquifido dentato fl. roseo,
Lavatera L. 3.

ALYSSUM, Eng. *Madwort*.

- | | |
|-----------------------------|--|
| P. 1. II $\rightarrow +$ a. | 1. Fol. lanceolatis integris R. 6. L. 4. |
| P. 1. II $\rightarrow +$ a. | 2. Eadem fol. Eleg. Varieg. |
| P. 1. II $\rightarrow +$ a. | 3. Alpinum hirsutum Luteum B. 17. draba R. 2.
L. 1. |
| P. 1. II $\rightarrow +$ a. | 4. Fol. lanceolatis repando dentatis L. 8. |
| P. 2. Ω a. | 5. Caule Erecto fol. lanceolatis incanis L. 5. |

AMARANTOIDES.

F. e. 1. Fruticosis Caule erecta, *gompbrena* L. 2.

AMARYLLUS, Fr. *Lis-narcisse*, Eng. *Lily-daffodil*.

- | | |
|--|--|
| B. \approx a. | 1. Spatha uniflora R. & L. 1. <i>lilionarcissus luteo</i>
<i>autumn.</i> T. |
| B. II b. | 2. . . . R. & L. 2. <i>lilionarcissus ind.</i>
<i>fl. ex albo exterius rubento</i> T. |
| B. $\vee \Omega \rightarrow +$ e. \mathcal{J} . x. | 3. . . . R. & L. 3. <i>lilionarcissus fl. san-</i>
<i>guineo nutante.</i> |
| B. $\Omega \rightarrow +$ d. * | 4. . . . R. 4. L. 5. <i>lilionarcissus rutilo</i>
<i>flore</i> B. 3. |
| B. $\Omega \rightarrow +$ d. * | 5. . . . suaviter rubento, petatis un-
dulatis. |
| B. II $\rightarrow +$ e. \mathcal{J} . x. | 6. . . . R. 5. L. 4. <i>lilionarcissus fl. in-</i>
<i>carnato funde ex luteo albescente</i> B. 4. |
| B. II $\rightarrow +$ d. * | 7. . . . omnium maxim fl. albescente. |
| B. II $\rightarrow +$ d. * | 8. . . . R. 7. <i>lilionarcissus fl. niveo ex-</i>
<i>terne purpureo striato</i> B. 5. |
| B. II $\rightarrow +$ d. * | 9. . . . fl. ex albo & purpuræscente
mixto. |
| B. II $\rightarrow +$ d. * | 10. . . . L. 8. <i>Brunswichia dicta.</i> |
| B. II $\rightarrow +$ d. * | 11. . . . pumila umbella sphaerace-
phalofus. |
| | 12. Spa. |

Habitus Culture

ANAGYRIS, Fr. Bois puant, Eng. Stinking bean-trefoil.

A. 3. Ω + c.

1. Fœtida, R & L.

ANANAS, Eng. pine-apple.

1. Fol. vix serrato, B. 5. non spinosa M. 3.

2. Fructu ovato Carne albidæ, M. 1.

3. . . . pyramidato, ex viridi flavescente
M. 6.4. Fructu pyramidato, carne aurea M. 2. bromelia
L. 1. β .

5. . . . ovato Carne rubra, ex malacca dicta.

P.

f./o.x.

6. Silvest. brasiliiana karatas M. Bromelia L. 3.

7. Amer. Sylvest. altera minor β . 3. Pinguindicta.8. Lucido Virens non Spinosa, M. 4. bromelia
L. 1. δ .9. Silvestris Caraibiensis latifol. Spinosa, viridi
Lucens.

10. Karatas dicta, fructu hirsuto.

11. acerrimo.

12. dulce.

ANAPODOPHYLLON, Eng. May-apple.

P. $\frac{1}{2}$. γ + a.

1. Canadensis, B. podophyllon R & L.

ANEMONE, Eng. Wind flower.

P. 2. Ω a.

1. Virg. fl. albo R. 2.

R. 1. γ + a.

2. Hortensis latifolio fl. purpurascens B. 3.

R. 1. γ + b.3. Hortensis fol. multifidis fl. pleno d'ont on
trouve Chez nous, une Collection de plus
que 300 Especies en toutes sortes des Cou-
leurs, & d'un beaute acheve.

ANEMONOIDES, Eng. Wood-anemony.

R. $\frac{1}{2}$. γ + a.1. Flore albo pleno B. 10. Anemone R. 3.
L. 15.R. $\frac{1}{2}$. γ a.

2. . . . luteo bino B. 9. anemone R. 3. L. 17.


R. $\frac{1}{2}$. γ + a.

3. . . . pleno purpurascens, B. 3.


R. $\frac{1}{2}$. γ + a.

4. . . . fl. majore intensiore Cæruleo, B. 4.

ANE-



Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.



Antholyza flore coccineo Linnæi Sp. pl. N^o 2.
Cunonia dicta

A. Dufres del. et Sculp. 1739.

14 *Catalogue des Arbres & Plantes Etrangères.*

Habitus Culture

P. 3. Ω + a.

6. Ut No. 4. fl. pallide purp.

P. 1. Ω + a.

7. Vel linaria lutea fl. majore L. 21.

APIOS, Eng. *Knobbed-rooted wetch*.

V. R. m + a.

1. Americana Cornutii B. *Glycine* L. 1.

APIUM, Fr. *Perfil*, Eng. *Parsley*.

P. 2. m b.

1. Macedonicum B. *bubon* L. 1.

P. 3. m a.

2. Pyrenaicum thapsiæ facie T.

P. 4. m c.

3. Dulce; Celleri dictum, fol. Eleg. Varieg.

APOCYNUM, Fr. *Apocin*, Eng. *Dogs-bane*.

P. 1. Ω m + a.

1. Fl: lili Convalli B. 10. R & L. 1.

P. 3. Ω + a.

2. Canadensis Erectum, fl. rubicundis, B. 5. *asclepias* R. 5. L. 8.

F. δ + e.

3. Amer. fl. umbello auranteo, B. 17. *asclepias*, R. 7. L. 9.

P. 2. Ω + a.

4. Nova angliae radice tuberosa, floribus auranteis *asclepias* R. 6. L. 18.

P. 4. Ω + a.

5. Latifolium incanum fl. obsoleto purpurascen- te B. 1. *asclepias* R. 4. L. 3.

F. δ + d.

6. Afr. fol. salice lato, fl. albo B. 15. *asclepias*, R. 3.

F. δ + d.

7. . . . angusto, fl. albo B. 16. *asclepias*, L. 14.

F. Ω d.

8. Caule recto arborea fol. ovatis acutis, R. 3. L. 4.

V. Ω + d.

9. Afr. schandens vincæ pervinæ fol. subincanis B. 18. *Cynanche* R. 6 *periplosa* L. 3.

F. Ω d.

10. . . . subrotundo, folio, fl. albo B. 11.

A. 4. w + d.

11. . . . fruticos. late fol. fructu geminæ sulcato spinoso, B. D. 2.

P. 1. Ω a.

12. Virg. androsæmi folio, fl. albo,

V. Ω d.

13. Afr. vincæ pervinæ fol., oppositis, caule volubili.

P. 2. Ω d.

14. Pensylvanicus fl. albo.

F. δ + e.

15. Ut No. 3. flore albo.

V. Ω c.

16. Fol. Cordiformi fl. albicante, *Cynanche* L. 1.

V. Ω c.

17. Caule volubili fol. Cordato Lanceolatis.

AQUI

Habitus

Cultuure

AQUIFOLIUM, Fr. *Houx*, Eng. *Holly*.

- A. 4. b. 1. Caroliniensis fol. ovato lanceolato dentato, M. 33.
 a. 2. Fol. echinata superficie, B. 10. M. 6.
 a. 3. Eleg. ex albo varieg. M. 9.
 a. 4. Latifolio, spinis & limbus argenteis, M. 5.
 b. 5. Foliis minoribus spinis & limbus argenteis, M. 5.
 a. 6. Lauri fol. spinis viduis.
 a. 7. Lauri fol. Eleg. varieg. spinis & limbus aureis.
 a. 8. Angusti folio spinis & limbus aureis.
 a. 9. . . . aureis spinis & limbus viridis; baccis rubro.
 a. 10. Latifolio spinis & limbus aureo fructu rubro.
 b. 11. Latifolio ex viridis & aureis Elegantiss. variegato, baccis luteis.
 a. 12. Latifolio baccis aureis, M. 2.
 a. 13. Fol. subrotundo, ex albo Eleg. varieg. M. 11.
 b. 14. Fol. oblongo spinis & limbus argenteis, M. 13.
 A. 3. II { b. 15. Fol. subrotundus, limbus argenteis spinulis & marginalibus purpurascentibus, M. 14.
 b. 16. Fol. longioribus, limbus & spinus, ex unicotam, later pertotum argenteo pictis, M. 10.
 b. 17. Fol. oblongus, spinus & limbus flavescentibus, M. 15.
 a. 18. Fol. lato spinis & limbus albicantibus.
 b. 19. Fol. parvis, interdum vix spinosa limbus & spinis argenteis.
 a. 20. . . oblongis spinis & limbis luteis, M. 17.
 b. 21. . . subrotundo spinis minoribus, fol. ex luteis, Elegantissimo varieg. M. 18.
 b. 22. . . latioribus spinis & limbis flavescentibus, M. 20.
 b. 23. . . oblongis, spinis & limbis ocroluteis, M. 30.
 b. 24. . . . ex luteo & aureo Eleg. varieg. M. 27.
 b. 25. . . . spinis majoribus, fol. ex aur. var. M. 21.

C 2

26. Fol.

Habitus

Cultuure

- | | | | |
|----------|---|----|---|
| A. 3. II | } | b. | 26. Fol. oblongis lucidis spinis & limbis arg.
M. 12. |
| | | b. | 27. ex luteis Eleg. var. baccis aureis. |
| | | b. | 28. subrotundis spinis & limbis aureis, M. 22. |
| | | b. | 29. angustiori spinis & limbis flavescenti-
bus. |
| | | b. | 30. oblongis lucidis spinis & limbis aureis,
M. 16 |
| | | a. | 31. Echinata, superficie, fol. ex luteis Va-
rieg. M. 7. |

AQUILEGIA, Fr. *Ancholie*, Eng. *Columbine*.

- | | | | |
|----------|---|----|--------------------------------|
| P. 2. II | † | a. | 1. Fl. pleno purpureo, B. 8. |
| P. 2. II | † | a. | 2. varieg. B. 11. |
| P. 2. II | † | a. | 3. stellato varieg. |
| P. 2. II | † | a. | 4. Rubento ferrugineo. |
| P. 2. II | † | a. | 5. intensiore Cæruleo. |
| P. 2. II | † | a. | 6. stellato rubello. |

ARALIA, Eng. *Berry-bearing*.

- | | | |
|---------|----|--|
| A. 3. | b. | 1. Caule foliolisque æculeata L. 1. |
| P. 2. 6 | a. | 2. Canadensis racemosa L. 3. |
| A. 3. | a. | 3. Folio lanceolato, <i>arrow wood dicta</i> . |

ARBOR JUDA, Fr. *Guainier*, Eng. *Judas-tree*.

- | | | | |
|---------|---|----|--|
| A. 3. 8 | † | a. | 1. Fol. Cordato orbiculatis glabris, <i>Cercis</i> L. 1. |
| A. 3. 8 | † | a. | 2. Canadensis. |
| A. 3. 8 | † | a. | 3. Carolinensis floribus parvis. |

ARBOR TULIPIFERA, Fr. *Tulipier*, Eng. *Tulip tree*.

- | | | | |
|---------|---|----|--|
| A. 2. Ω | † | a. | 1. Virginiana, <i>Liriodendron</i> , L. & R. |
|---------|---|----|--|

ARBUTUS, Fr. *Arbousier*, Eng. *Strawberry tree*.

- | | | | |
|---------|---|----|--|
| A. 3. ∞ | † | b. | 1. Fol. latiori serrato, fructiferens, L. 1. |
| A. 3. ∞ | † | b. | 2. fl. duplici M. 3. |
| A. 3. ∞ | † | b. | 3. angustiori fl. rubro. |

ARI-

Catalogue des Arbres & Plantes Etrangères.

17

Habitus Culture

ARISTOLOCHIA, Eng. Birth-wort.

- P. 3. II a. 1. Caule Erecto L. 13.
P. I. II m + b. 2. . . infirmi fl. ex purpura nigro L. 11.
F. 6 + b. 3. Smilace fol. floribus recurvus L. 8.
F. 5 m + c. 4. Caule erecto fol. Cordato fl. purpureo L. 12.

ARTEMISIA, Fr. Armoise, Eng. Meigwort.

- P. 2. m a. 1. Fol. ex argenteis varieg. B. 3.
F. m b. 2. . . lanceolatis subtus. tomentosis, L. 14.
F. m d. 3. Afr. fol. bipinnatis, ad L. 11.

ARUM, Fr. Pied de veau, Eng. Wake-robin

- P. 2. v + d.* 1. Ægyptiacum vulgo, B. 6. Calla L. 1.
P. 1. v + d.* 2. Afr. fl. albo vix odoratis minus, B. 7.
B. 2. II + a. 3. Fol. palmatis Caule maculato, R & L. 1.
B. 1. 6 a. 4. . . . non maculato, R & L. 2.
P. 1. e.o.f. 5. . . peltatis ovatis, R. 3. L. 6.
P. 2. e.o.f. 6. . . cordatis obtusis cum acumine, R. 6.
L. 8.
P. 1. e.o.f. 7. Acaule fol. sagittatis, pediculis & foliorum
atropuniceis, R. 9. L. 11.
P. 1. e.o.f. 8. Zeylanica minus pediculis puniceis, B. 4.
P. 2. v + d.* 9. Ut No. 1. fol. variegato.
V. + f.o.f. 10. Hederaceum fol. perfoliatis, dracontium,
L. 5.
R. II a. 11. Vulgare maculato, R. 10. L. 12. β.
R. II a. 12. Palustris radice aurandineo, B. 5. Calla,
R. 1 L. 2.
P. 1. e.o.f. 13. Acaule folio sagittatis triangulis, R. 9.

ARUNCUS.

- P. 4. 6 a. 1. Fol. supra decompositis, Spiræa L. 8.

ARGYRODENDRON, Eng. Silver-tree.

- A. 3. d. 1. Seu Conocarpodendron fol. argenteis sericeis latissimis, Protea L. 1.

C 3

ARUN.

ARUNDO, Fr. Roseau, Eng. Reed.

- P. 3. f. o. 1. Sacharifera B. 4. Saccharum L. 1.
 P. 6. c. 2. Indica Variegato, B. 3. L. 2. β.
 P. 10. a. 3. Sativa, donax dicta L. 2.
 P. 3. f. o. 4. Orientalis.

ASARUM, Pr. Cabaret, Eng. Asarrabacca.

- P. 1/2, γ a. 1. Fol. subcordatis L. 1.

ASCLEPIAS, Fr. Domphe Venin, Eng. Swallow-wort.

- P. 1/2. Ω + e. o. f. 1. Azoides afr. B. 4. M. 4. Stapelia R & L. 1.
 P. 1/2. e. o. f. 2. . . . fol. Compresso digitato & Cri-
 stato, B. 6 M. 6.
 P. 1. Ω + e. o. f. 3. . . . fl. pulchro fimbriato, B. 5. M. 5.
 Stapelia R & L. 2.
 P. 1. e. o. f. 4. ramorum erectis denticulis ma-
 gnis.
 V. Ω m + a. 5. Caule volubili nigro flore, L. 13.
 P. 3. Ω a. 6. . . . erecto fl. albo, L. 12.
 P. 3. Ω a. 7. flavescente, B. 2.

ASCYRUM, Eng. St. peters Wort.

- F. δ + d. 1. Balearicum frutes: maxim. fl. luteo, B. 2.
 hypericum, R & L. 1.
 P. 1. Π + a. 2. Magno flore, B. 1. hypericum, R. 2. L. 4.

ASPARAGUS.

- V. Ω c. 1. Afr. schandens Myrti fol. R. 7. Medeola, L. 3.
 P. 3. c. 2. . . . tenui folio vimenalibus virgis, R. 3.
 L. 4.
 P. 1. d. 3. . . . aculeatis minor, B. 7.
 P. 2. c. 4. Hispan. aculeis Crassioribus horridis, T.
 P. 2. d. 5. Afr. aculeatis fol. linearibus lucidis spinis re-
 flexis.
 P. 1. d. 6. . . . inermis ramis declinatis, B. 6. L. 2.

ASPE

Catalogue des Arbres & Plantes Etrangères.

19

Habitus Culture

ASPERULA, Eng. *Wood-roof*.

- P. 2. II + a. 1. Fol. quaternis ovato lanceolatis, R & L. 3.
P. 2. II a. 2. Odorata fl. albo, R. 2. L. 1.

ASPHODILUS, Fr. *Asfodele*, Eng. *Kingspear*.

- P. 2. ⑥ + a. 1. Luteo flore & radice, R & L. 1.
P. 1. ⑥ + a. 2. Alobrogicus magno fl. lilii, *Hemorrhoidalis*, R
 & L. 2.
P. 2. ⑥ + a. 3. Albis non ramosis, B. 3.

ASPLENIUM, Fr. *Ceterac*, Eng. *Spleenwort*.

- P. 1. ⑥ b. 1. Sive *Cæterach*, R & L. 7.

ASTER, Eng. *Star-wort*.

- P. 6 Ω a. 1. Om. maximum helenium dictum R. 1. *inula*
 L. 1.
F. 8 + d. 2. Afr. fruticosa, fol. angustis fl. Cæruleo, R.
 10. L. 1.
F. 8 + d. 3. oblongo rotundo, rugo-
 so, fl. Elegantissimo Cæruleo *otbonna* fl.
 Cæruleo.
P. 2. Ⅲ + a. 4. Atticus Cæculus vulgaris, R. 15. L. 5.
P. 3. Ⅲ a. 5. Amer. latis & Crenatis fol. R. 9.
P. 3. Ⅲ + b. 6. Tripoli flore, angustiss. fol. R. 8. L. 10.
P. 2. Ⅲ + a. 7. Canadensis fol. imis ampliori Cordato, M. 25.
P. 5. Ⅲ + a. 8. Virg. ferrotinus parvo albente flore, R. 7.
 L. 24.
P. 4. Ⅲ + a. 9. Nova anglia virga aurea facie fl. Cæruleo.
P. 1. 8 + d. 10. Afr. humillima fol. linearib. fl. Cæruleo. fem-
 per florescente.
F. Ω + d. 11. Afr. fruticosa fol. linearibus Cinereis flore
 amplo Cæruleo.
P. 2. Ⅲ a. 12. Humilis fol. linearibus, fl. pallide Cæruleo.

ASTEROIDES, Eng. *Yellow starwort*.

- P. 1. ⑥ m + a. 1. Alpina Salice folio B. *bubthalmum*, R. 5. L. 59
P. 1. 8 + c. 2. Maritimus perennis B. 7. *bubthalmum*, R. 3.
 L. 5.
 3. Vir-

20 Catalogue des Arbres & Plantes Etrangères.

Habitus Culture

- P. $\frac{1}{2}$. Ω + a. 3. Virginianis amplo flore.
F. \rightarrow + c. 4. Frutescens leucoe fol. sericeis, *bubthalmum*,
R 6. L. 1.

ASTRAGOLUS, Fr. *Astragale*, Eng. *Milk vetch*.

- P. 3. \odot + a. 1. Alpina, alopecuroides, R. & L. 1.
P. 3. \odot + a. 2. Orient. fol. galega, B. 3. T.
P. 4. \odot a. 3. Leguminis subglobosis, B. 3. filiqua Curta,
R. 12. L. 11.

ASTRANTIA, Eng. *Master wort*.

- P. 2. \odot a. 1. Major floris candidis, B. 2. R & L. 1.

ATAMANTHA, Eng. *Spiguel*.

- P. 2. \odot a. 1. Fol. Capillaribus, R. 1. L. 5.
P. 2. \odot a. 2. . . multifidis planis, R. 3. L. 4.

ATRACTYLUS, Eng. *Distaff thistle*.

- F. δ + c. 1. Fol. oblongo ovato, R. 2. L. 1.

ATRAPHAXIS.

- F. μ d. 1. Inermis, L. 2.

ATROPHA, Eng. *Deadly nightshade*.

- P. 2. Ω a. 1. Caule herbaceo L. 1. *belladonna*, *solanum furio-*
sum vulgo.
P. 2. Ω m + b. 2. . . fruticoso, L. 3.

ATRIPLEX, Fr. *Pourpier de mer*, Eng. *Orrach*.

- A. 4. \approx b. 1. Latifolio fruticoso, R. 5. L. 4.
F. \approx a. 2. Angusti folio fruticoso, L. 2.
F. \approx c. 3. Fruticoso fol. arcuatis acutis fessilibus.

AZALEA, Eng. *American honeysuckle*.

- F. δ + b. 1. Flore rubro.

Catalogue des Arbres & Plantes Etrangères. 21

Habitus Cultuure

AZEDARACH, Eng. *Bead-tree*.

- A. 3. $\text{m} + \text{b}$. 1. Major fl. Cœruleo, B. 1. *melia*, R. 2. L. 1.
A. 4. $\Omega + \text{c}$. 2. Minor fl. Cœruleo odorato, *melia*, L. 1. β .

AURANTIUM, Fr. *Oranger*, Eng. *Orange tree*.

- d. 1. Anglium dictum fol. ex albo varieg.
c. 2. . . . dictum fol. ex aureo varieg.
c. 3. Chinensis medulla dulci, *Olysiponensis Ferrari*.
d. 4. . . . medullæ dulci, cortice tenui.
c. 5. . . . medullæ acri.
c. 6. Corniculatum, Ferrari.
d. 7. . . . fol. Eleg. ex aureo varieg.
c. 8. Curasavica vera.
c. 9. Folio Cripso, Ferrari.
d. 10. . . . Cripso, Eleganter variegato.
c. 11. . . . Cripso acuto fr. maxim. per maturæ
viridi.
c. 12. . . . & fructo varieg. *Virgatum Ferrari*.
d. 13. . . . & fructu ex aureo Eleg. varieg.
c. 14. Flores & fructu quasi umbellatæ.
c. 15. Fl. plene fructu duppresso, *flores duplici Ferrari*.
c. 16. Fl. rubro fructu atro viridis.
A. 2. $\Omega + \text{c}$ c. 17. Fructu amaro.
c. 18. . . . dulce.
c. 19. . . . duppresso, *Bergamothi vulgo*.
c. 20. . . . facie Limonis.
c. 21. . . . facie Limonis altera sorte.
c. 22. . . . oblongo glabro.
c. 23. . . . querci effigui.
c. 24. . . . incanellatum vel melonato, *striatum Ferrari*.
c. 25. Indie occidentalis, *Pompelmoes fol. non Serrato*.
c. 26. . . . occidentalis, Cripso folio.
c. 27. . . . occident. Cripso fol. per intervallæ
variegato.
c. 28. . . . occid. Cripso fol. quasi incanis.
c. 29. . . . occid. fol. valde Lobatis.
c. 30. . . . occid. fructu carno rubro.
c. 31. . . . orient. fol. Cripso fructu odoratissimo.
c. 32. . . . orient. fol. Cripso per intervallæ
variegato.

D

23. Indi-

Habitus

Cultures

- | | | |
|-----------|----|--|
| | c. | 33. Indicus max. pomelmoes folio serrato, aurantium max. ferrari. |
| A. 2. Ω + | c. | 34. . . . max. furinamensis. |
| | d. | 35. Hermaphroditum fructu partim aurantii partim citrii, Bisarre vulgo Aurant. Callosum Ferrari. |
| F. Ω + | d. | 36. Humilis Chinenfis, vulgo nana, aur. sinensis Ferrari. |
| | d. | 37. . . . Chinenfis fol. ex albo Eleg. varieg. |
| | d. | 38. . . . Chinenfis fol. ex Luteo variegato. |
| | c. | 39. Salicis angusti folio fructi dulce. |
| A. 2. Ω + | c. | 40. . . . ang. fol. varieg. fructu dulce striato. |
| | c. | 41. . . . Late folio. |
| | c. | 42. . . . late fol. variegato. |
| | c. | 43. Schorfa grossa |
| | c. | 44. . . . grossa fol. acutis. |
| | c. | 45. Angliæ dicta. |
| | c. | 46. Fructu Costato verrucoso. |
| | c. | 47. Salice fol. altera. |
| | d. | 48. Americana, fol. myrti ampliori, pompadoure dicta. |
| | c. | 49. Calabriae fructu Limoni. |

LIMON, Fr. Limonier, Eng. Lemon-tree.

- | | | |
|-----------|----|--|
| A. 2. Ω + | c. | 1. Angustissimo folio. |
| | d. | 2. Aguezo apeto. |
| | c. | 3. Augusto Rola di Portugal dulce. |
| | d. | 4. Barbarino longo, Pseudocitratus barbarinorum Ferrari. |
| | c. | 5. Bergamotte bisarreco. |
| | c. | 6. . . . delle grande sorte. |
| | c. | 7. . . . ordinario confoglia Liscia. |
| | c. | 8. Bianco del ferrario. |
| | c. | 9. Bisantinum. |
| | d. | 10. Bisarreco fol. Elegantiss. varieg. |
| | d. | 11. Citrato giaretto. |
| | d. | 12. De Chios. |
| | c. | 13. De gaëta, Cajetanus Ferrari. |
| | d. | 14. . . . foliis variegatis. |
| | d. | 15. De Surinaam. |
| | d. | 16. Del Cabo du bona esperance. |
| | c. | 17. Della grande sorte di Lago st. Garda. |

18. Del.

Catalogue des Arbres & Plantes Etrangères. 23

Habitus

Cultuure

- | | |
|----|---|
| d. | 18. Della Gianda fructu dulce, coronato, acer
<i>Limoen.</i> |
| c. | 19. d'Hollande. |
| d. | 20. Di curacao. |
| d. | 21. . . . grande. |
| c. | 22. Di Geneve. |
| c. | 23. Di Portugal. |
| c. | 24. . . . grande. |
| c. | 25. Di Roma. |
| c. | 26. Di st. Remo oblonga Costa minori. |
| c. | 27. Digitato, <i>katte klaauw vulgo.</i> |
| d. | 28. Ex bisarreo degener. |
| c. | 29. Fol. duro Cordato. |
| d. | 30. . . Crispo fructu Cucumerino. |
| c. | 31. . . ex Luteo variegato, <i>Amstelveense bonté.</i> |
| c. | 32. Fructu albo magno. |
| c. | 33. . . . auro Coloris, <i>Goud limoen vulgo.</i> |
| d. | 34. . . . Cucumerino. |
| c. | 35. . . . dulce, <i>dulci medulla Vulgaris Ferrari.</i> |
| d. | 36. . . . dulce fol. variegato. |
| d. | 37. . . . incanellato, <i>striatus Vulgatior Ferrari.</i> |
| d. | 38. . . . incanellato, altera forte. |
| c. | 39. Incognita. |
| c. | 40. . . . altera forte. |
| c. | 41. Monstrosa. |
| c. | 42. Pomum adamí communi Ferrari <i>zwarte Limogn.</i> |
| c. | 43. . . . adamí altera forte. |
| d. | 44. . . . adamí Citrato. |
| d. | 45. . . . adamí foetiferum, <i>alteram includens Ferrari.</i> |
| d. | 46. Ponsino rubens, ferrari. |
| c. | 47. Sainct remi, ferrari. |
| c. | 48. Salerno. |
| c. | 49. Sbardonius, ferrari. |
| c. | 50. Vulgaris, ferrari. |
| c. | 51. Fol. acutissimo. |
| c. | 52. Digitato altera forte. |
| d. | 53. Fol. ex aureis luteis & viridis varieg. |
| d. | 54. . . . petiolatis. |
| c. | 55. Grande. |
| c. | 56. Occidentalis. |
| c. | 57. Acuminatis. |
| c. | 58. Di napolí. |

A.2.9+

D 2

59. Cc

Habitus

Cultuure

A.2.Ω† {

c.
c.
c.
c.

59. Cedrato.
60. Forte Costato.
61. Imperiali.
62. Fol. oblongo.
63. . . rotundiori.

L I M O N E T.

A.3.Ω† {

d.
d.
d.
d.
c.
c.
d.
d.
c.
d.
d.
c.
d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.

1. Amer. fr. parva dulce.
2. Calabria major. } *Limon pucillis Calabrie Ferr.*
3. . . . minor. } *rari.*
4. . . . di napolì.
5. Ex horto domini de Maraiz.
6. Foliis undulatis.
7. Fructu amaro, *Lima acris Ferrari.*
8. . . . dulce, *Lima dulcis Ferrari.*
9. Ou Lumia a pyretto con foglia Liscia.
10. Ou Lumia a Zuchetta.
11. Ou Lumia d'Hollande di fiore doppio.
12. Ou Lumia racemosa, *Limon racemosa ferrari.*
13. Salicis fol. *Lima fl. pleno vel salia.*
14. Cerasi folio.
15. Vel limia olesipponensis.
16. . . . regia minima
17. . . . parva de St dominique.
18. . . . da ragusina.
19. . . . imperiali.

CEDRO, Fr. Citroenier.

A.2.Ω† {

d.
d.
c.
c.
d.
c.
c.
c.
c.
c.
d.
c.
d.
c.
d.
c.

1. Apyretto.
2. Acuminato di St. Remo.
3. Bergamotti.
4. Del Zanten.
5. Gaëtani.
6. Grande Liscio bondolotto.
7. Incognita.
8. . . . altera forte.
9. Judaica.
10. Ordinario col pigolo.
11. Vulgaris, *citream Vulgaris Ferrari.*
12. Fol. ex albicante maculato, velpunctato.
13. Magno fol. mucronato.
14. Non spinoso fructu longo.
15. Longo.

17. Fructu

Catalogue des Arbres & Plantes Etrangères.

25

Habitus

Cultuure

- | | | |
|-----------|----|---------------------------------|
| A. 2. Ω + | d. | 16. Fructu Minore. |
| | c. | 17. d'Hollande. |
| | c. | 18. Verrucoso. |
| | d. | 19. Grande verrucoso de guadix. |
| | d. | 20. Monstroso. |
| | c. | 21. Di grande rive. |

P. 1/2. 8 +

a. AURICULA URSY, Fr. Orielle d'ours, Eng. Bear's ear. Dont on, trouve ci apres un denombrement des plus beaux Especes en toute sortes des Couleurs & ouvrages.

BACHARIS, Eng. Plowman's spikenard.

- | | | |
|---------|----|--------------------------------|
| F. Ω | c. | 1. Fol. dentato ferrato, L. 1. |
| F. Ω | c. | 2. . . obverse ovatis, L. 4. |
| A. 3. η | c. | 3. . . lanceolatis, L. 3. |

BARBAJOVUS, Eng. Jupiters beard.

- | | | |
|---------|----|--|
| A. 4. Ω | c. | 1. Pulchre Lucens, M. 1. anthyllis, L. 6. |
| F. 8 + | d. | 2. Fol. pinnatis fl. Cæruleo, M. 4. pforalea, L. 1. |
| F. Ω + | a. | 3. Caroliniensis pseudoacacia fol. M. 3. amorphæ, L. |

B A R L E R I A.

- | | | |
|--------|-------|--|
| F. | e. o. | 1. Spinis laterialibus, R. L. 2. coletta veetla. |
| F. η + | d. | 2. Fol. subrotundis, L. 3. fl. albo oderato. |
| F. η | f. o. | 3. . . lanceolatis fl. albo. |

BASELLA, Eng. Climbing nigchtshade.

- | | | |
|------|-------|---|
| V. Ω | e. o. | 1. Fol. planis, Caule palefcente, L. 1. M. 2. |
| V. Ω | e. o. | 2. purpurafcente, L & M. 1. |

BAUHINIA, Eng. Mountain ebony.

- | | | |
|--------|----------|--|
| F. η + | f. o. x. | 1. Non aculeato fol. bicornis, L. 3. |
| F. η + | f. o. x. | 2. profundiore incisifis, H. O. tab. 15. |

D 3

BEN-

26 *Catalogue des Arbres & Plantes Etrangères.*

Habitus

Cultuure

BENSOIN, Eng. *Benjamin tree.*

A. 4. 8 b. 1. Officinarum, B. *Laurus*, L. 9.

BERBARIS, Fr. *Epine-vinete*, Eng. *Berbercy.*

A. 3. II + a. 1. *dumetorum*, L. 1.

BERMUDIANA.

P. 1. 8 + a. 1. *Iridis folio*, L. 1. β.

P. 1. 8 f. o. 2. *Palmae fol. radice phœniceo fl. albo*, B & M. 2.

BETONICA, Fr. *Betoine*, Eng. *Betony.*

P. 1. II + a. 1. *Orient. Spica florum Crassioris* L. 2.

P. 1. II a. 2. *Purpureo* L. 1. α.

P. 1. II a. 3. . . . fol. *Eleg. Varieg.*

BETULA, Fr. *Bouleau*, Eng. *Birch-tree.*

A. 3. a. 1. *Nigra Virginiana* L. 2.

A. 3. a. 2. *Fol. Cordatis oblongo, acuminatis ferratis*, L. 3.

BIGNONIA, Fr. *Jasmin d'Amérique*, Eng. *Trumpet flower.*

A. 3. 12 a. 1. *Fol. Simplici Cordato*, L. 1. *Catalpa dicta.*

V. 2 + a. 2. *Amer. fraxini fol. fl. amplo Phœniceo* L. 10. α.

V. 2 + a. 3. . . . *schandens fol. pinnatis foliolis denticulatis.*

V. 2 + a. 4. *Carolini fraxini fol. fl. coccineo minore* L. 10. β.

V. 2 + a. 5. *Bifolia schandens*, L. 4.

V. 2 + a. 6. *Amer. schandens tetraphylla & pentaphylla* M. 10.

V. 2 + a. 7. *Caroliniensis schandens floribus luteis odoratis* M. 11.

BISTORTA, Eng. *Snake weed.*

P. 1. 8 + a. 1. *Major radice intorta* R. 1. *polygonum* L. 2.

P. 1. 8 + a. 2. *Alpina Sobolifera* B. 3. *polygonum* L. 3.

PIXA,

Catalogue des Arbres & Plantes Etrangères.

27

Habitus

Cultuure

BIXA, Fr. Rouco, Eng. Arnotte.

A. 4. g. o. x. 1. Americana R & L.

BLATTARIA, Fr. Herbe aux mites, Eng. Moth mullein.

P. 3. ♂ + a. 1. Perennis fl. obsoleto fusco apice pistilla purp.
B. 2. M. 8. *Verbascum* L. 3.

P. 2. ♂ + a. 2. . . . fl. amplo purp. B 5. *Verbascum* R. 6.
L. 5.

P. 2. ♂ + a. 3. . . . degener, fl. amplo pallide purpureo.

BONDUC, Eng. Nickar tree.

A. 3. f. o. x. 1. Majus polyphyllum B. guilandina L. 1.

BONTIA, Eng. Wild olive.

F. f. 1. Laureola facie L.

BORRAGO, Fr. Bourache.

P. 1. γ + b. 1. Constant. fl. reflexo R. & L. 4.

BOSEA, Eng. Golden-rod tree.

A. 4. Ω c. 1. Racemosa, yerva mora dicta L.

BRYONIA, Fr. Colenurée.

R. V. Ω c. 1. Afr. lacineata fol. tuberosa radice R. 3. L. 5.

V. c. a. 2. Curassavica fol. dentata Crasso B. 7. *Sicyos*
L. 3.

BUGULA, Fr. Bugle.

P. 1. ♂ + b. 1. Orient villosis fl. purp. B. 6. M. 8. *ajuga*
L. 1. β.

BULBINE, Eng. Spiderwort.

F. ♂ + c. f. 1. Caulescens floribus aureis R. 1. *anthericum*
L. 4.

P. $\frac{1}{2}$. ♂ + c. f. 2. Acaulus fol. subulatis R. 3. *anthericum* L. 6.

P. $\frac{1}{2}$. ♂ + c. f. 3. . . . Lanceolatis R. 2. *anthericum* L. 5.

P. $\frac{1}{2}$. ♂ + c. f. 4. . . . Cetaceis Caule angustiore R. 4.

P. 1. ♂ + c. f. 5. . . . Capæ succulentis, floribus spicato
amplo aureo.

BUL

Habitus

Culture

BUBTHALMUM, Fr. *Oeil de beuf*, Eng. *Ox eye*.

P. 2. ♂ + a.

1. Orient. tanacet. fol. fl. aureo amplissimo R. 9.
anthemis L. 16.

P. 2. ♂ + a.

2. Eadem fl. Sulphures.

P. 2. ♂ + a.

3. Alpinum fl. Candido, *anthemis* L. 16. β.

F. 2. d.

4. Virginian. fruticosum Leucoi viridi folio.

BULBOCASTANUM, Fr. *Terre noix*, Eng. *Earth nut*.

R. 2. II a.

1. Majus fol. apii, B. 1. M. 1. *Bunium* R & L. 1.

BULBOCODIUM, Colchicum Vernal.

B. 1. V a.

1. Fol. lanceolatis R. 1. L. 1.

BUPLEURUM, Eng. *Hare s'ear*.

A. 3. M c.

1. Arbor salice folio, R. 1. L. 12.

F. M d.

2. Fol. linearibus, vel radicalibus pinnato R. 5.
L. 13.

BUPLEUROIDES

F. 5 c.

1. Quæ simpla nobis, *Phyllus* R. & L. 1.

BUXUS, Fr. *Buis*, Eng. *Box tree*.

F. 8 a.

1. Arboreus fol. ex aureis Varieg. B. 3. M. 3.

F. 8 a.

2. . . . argenteis Varieg.

F. 8 b.

3. . . . humilis fol. Eleg. Varieg. B. 16.
M. 6.

CALAMINTHUS

A. 3. f. o. x.

1. Fol. lanceolatis Splendentibus *Chrysophyllum* L.

CALAMINTHA, Fr. *Calament*.

P. 1. ♂ + a.

1. Montana longitudini florum B. 6. *melissa* L. 2.

P. 1. ♂ d.

2. Hispanica marii folio, B. 5. *melissa* R. 4. L. 6.

P. 1. ♂ a.

3. Montana Officinarum. *melissa* R. 2. L. 3.

CALCEOLUS Mariana, Fr. *Sabot*, Eng. *Ladies slipper*.

P. 1. b.

1. Fol. ovato Lanceolato, T. *cypripedium* L. 1. #.

CA

Habitus Cultuure

CALENDULA, Eng. *African Marigold*.

P. $\frac{1}{2}$. ♂ + d. 1. Afr. fol. linearibus, R. 4. L. 5. *caltha afr.*
croci folio B. 12.

F. ♀ + d. 2. Caule fruticoso R. 5. pag. 531. M. 4.

C A L L I C A R P A.

A. 4. d. 1. Fol. molli & incano L. 1.

C A L T H O I D E S.

F. ♀ b. 1. Fruticosis afr. Luteis, *othonna* L. 13. β.

CAMPANULA, Fr. *Campanule*, Eng. *Bell flower*.

P. 3. X + e. 1. Canariensis atriplici folio, L. 25. H. C. tab. 81

P. 2. ☉ + a. 2. Perficæ fol. fl. albo pleno B. & M. 5.

a. 3. Cæruleo pleno B. 3. } L. 7.
M. 5.

P. 2. ☉ + a. 4. Urtice fol. fl. duplici albo B. 23. M. 10.

P. 2. ☉ + a. 5. pallido. } L. 18.

P. 2. ☉ + a. 6. cæruleo B. 21. M. 9.

P. 3. ☉ + a. 7. Maxima fl. albo fere digitali, R. 4. L. 13.

P. 1. ☉ a. 8. Humilus fol. Cordato fl. oblongo Cæruleo.

P. 1. ☉ + a. 9. Minor Lineari fol. fl. albo, B. 11. L. 3. α.

P. 1. ☉ + a. 10. Cæruleo B. 10. L. 3. β.

P. $\frac{1}{2}$. ☉ + a. 11. Amer. minor fol. rigidis fl. albo.

P. $\frac{1}{2}$. ☉ + a. 12. cæruleo, R. 8.
L. 9.

P. 3. ☉ + b. 13. Maxima Lobeli, R. 6. L. 8.

P. 2. ☉ + a. 14. Rapunculus dicta. L. 5.

P. 3. ☉ + b. 15. Maxima Lobeli fol. variegatis.

C A M P H O R A T A.

F. ♂ + d. 1. Fl. albo umbellato, *selago*, R & L. 1.

CAMPHORIFERA, Eng. *Camphire tree*.

A. 2. M. c. 1. Officinarum B. *Laurus*, L. 3.

E

CAN

Habitus Culture

CANNA-CORUS, Fr. *Ballifier*, Eng. *Indian flowrigreed*.P. 2. Ω † e. x. 1. Ampliore flore, iridis palustre facie, Cann. P. 1.
R. 2. L. 3.

P. 2. Ω † e. f. 2. Amplissimo folio fl. rutilo, M. 5.

P. 2. Ω e. f. 3. Latifolia fl. luteo, R & L. 1. M. 1.

P. 2. Ω e. f. 4. Eleg. variegeto, M. 2.

P. 2. Ω † e. f. x. 5. fl. Coccineo splendoro, M. 4.

CAPPARIS, Fr. *Caprier*, Eng. *Caper-bush*.

F. nx † d. 1. Spinosa fol. rotundo, R & L 1.

CAPRARIA, Eng. *Sweet weed*.

F. ♂ f. 1. Fol. alternis, L. 1. M. 1.

F. ♂ f. 2. ternis, M. 2.

CAPRIFOLIUM, Fr. *Chèvre feuille*, Eng. *Honeysuckle*.

V. Ω † a. 1. Perfoliatum semper virens floribus speciosissimis, M. 10.

V. Ω a. 2. Non perfoliatum fol. ex luteo varieg. M. 5.

V. Ω † a. 3. Perfoliatum fl. albo præcox, M. 7. *lonicera*, L. 1.V. Ω † a. 4. Non perfoliatum fl. externe rubento, M. 2. *lonicera*, L. 3.

V. Ω † a. 5. albicante.

V. Ω a. 6. foliis sinuosis, M. 3.

V. Ω a. 7. & variegatis, M. 4.

CAPSICUM, Fr. *poivre d'inde*, Eng. *Barbary or bird pepper*.

F. Ω e. 1. Caule fruticose fructu parva erecto rubro, L. 2. M. 14.

F. Ω e. 2. aureo rotundo, M. 15.

CARAGANA.

A. 3. 1. Sibirica R. pag. 737. *Robinia*, L. 3. M. 3.

CAR.

Habitus Cultuure

CARDAMINE, Eng. *Ladies Smock*.

P. $\frac{1}{2}$. II + a. 1. Magno fl. pleno, M. 3.

CARDUUS, Fr. *Chardon*, Eng. *Thistle*.

P. 3. Ω + a. 1. Fol. & facie atractylus, R. 7. L. II.

P. 3. Ω + a. 2. Capite rotundo tomentoso, B. II, *chardon Musque*.

P. 4. Ω a. 3. Capite nutante, L. 4.

P. 5. Ω + a. 4. Mollis Circæa facie fl. rubro quæsi umbellato.

C A R E X.

P. I. Ω a. 1. Africana, fol. triangularis spica globosa.

CARICA, Eng. *Papaw-tree*.

A. 2. f. o. x. 1. Fructu melopeponi, L. 1.

CARLINA, Eng. *Carlina thistle*.

P. $\frac{1}{2}$. Ω + a. 1. Acaulos fol. amplis tomentosis fl. albo magno, L. 6.

P. $\frac{1}{2}$. Ω + a. 2. pinnatis fl. amplo argenteo.

CARPINUS, Fr. *Charme*, Eng. *Horn-beam*.

A. 2. a. 1. Virginianis florescens. M. 4.

A. 4. a. 2. Fol. ex luteo variegato, M. 2. L. 2. β.

CARYOPHYLLATA, Fr. *Benoîte*, Eng. *Avens*.

P. $\frac{1}{2}$. ∞ + a. 1. Alpina fl. amplo aureo, *geum* L. 4. α.

P. I. ♂ a. 2. Floribus erectis, *geum* L. 2.

P. I. ♂ a. 3. nutantibus, *geum* L. 3.

CARYOPHYLLUS, PLUMARIUS, Eng. *Pinks*.

P. $\frac{1}{2}$. Ω + a. 1. Tenui fol. fl. pleno amplo albo, fundo purpurascens.

P. $\frac{1}{2}$. Ω + a. 2. rubro *dianthus*, L. 9.

P. $\frac{1}{2}$. Ω a. 3. tenuissimo dissecto.

32 Catalogue des Arbres & Plantes Etrangères.

Habitus

Cultuure

CARYOPHYLLUS BARBATUS, Eng. Sweet-John.

- P. 1. ⑤ a. 1. Flore pleno Eleg. varieg. dianthus, L. 92.

CARYOPHYLLUS CHINENSIS, Fr. Oeillets de Chine.

- P. 1. ⑤ + b. 1. Latifolio fl. pleno. } dianthus, L. 8.
P. 1. ⑤ + b. 2. Angusti fol. fl. pleno. }
P. 1. ⑤ + a. 3. Floribus solitarius fl. parvo rubro varieg.
P. 1. ⑤ a. 4. Prolifera dianthus, L. 4.

- P. 2. ② + a & b.

CARYOPHYLLUS HORTENSIS, Fr. Oeillets, Eng. Carnation. Dont on trouve ci-après adjoint, un denombrement des plus beaux especes qui sont connue jusqu'ici en Hollande.

CASSIA, Fr. Casse.

- F. e. 1. Foliolis triumparium, L. 5.
F. f. o. x. 2. Fistula alexandrina, L. 12.
P. 3. ④ + b. 3. quinque vel sexjugatis, occidentalis.
F. ③ + f. o. x. 4. quatuor vel quinque jugatis, L. 10.
F. ③ + f. o. x. 5. quinque parium acutis lanceolatis.
P. 3. ④ + b. 6. Occidentalis, vel senna occident, vulgaris.

CASSINE, Eng. Southsea, thea.

- A. 4. c. 1. Vera floridanorum alterni ferme facie, M. 2. *illex*, L. 2. β.
A. 4. ④ d. 2. Capensis, R. 1. & L. 1. *lepelbont vulgo*.
A. 4. ③ + b. 3. Fol. acutioribus fl. albo umbellato, *vulgo Thee boom*.
A. 4. ③ c. 4. Fol. rotundioribus fl. albo umbellato, M. 1.

CASTANEA SATIVA, Fr. Chateigner, Eng. Chestnut.

- A. 3. ⑤ a. 1. Fol. ex aures Eleg. varieg. M. 2. *Fagus*, L.
A. 4. a. 2. Virg. pumila racemoso fructu parvo, M. 4. *Fagus*, L. 2.

CA

Habitus Cultuure

CASTANEA ÆQUINA, Fr. Maronnier d'inde,

Eng. Horse Chestnut.

A. 2. II + a.

1. Fol. ex luteo varieg. M. 2.

A. 2. II + a.

2. . . . albo varieg. M. 3.

} æsculus L.

CATANANCE, Eng. Lions foot.

P. I. 8 + b.

1. Quorundam fl. Cæruleo, L. 1. plantæ perenni.

CEANOTHUS, Eng. Staff tree.

F. f.

1. Fol. ovatis enerviis, L. 2.

F. m. v. + a.

2. . . . trinerviis, L. 1. Celasfris inermis, M. 1.

CEDRUS, Fr. Cédre.

A. 3. 8 c.

1. Ex goa fol. Cypressi, B. Juniperis, R. 5. L. 4.

A. 3. b.

2. Virginiana rubra.

A. 3. b.

3. . . . alba.

CELASTRIS.

A. 4. m. + d.

1. Afr. fructi triloculari, R. 1. L. 3.

F. b.

2. Inermis Corni fœminæ folio.

A. 4. II b.

3. . . . fol. ovato Lanceolato serrato, fructu aureo.

CELTIS, Fr. Micocoulier, Eng. Nettle-tree.

F. a.

1. Humilus virg.

A. 2. a.

2. Fructu obscure purpurascente, L & M. 1.

F. a.

3. Pumila Helvetica.

CENTAUREA, Fr. Grande Centaurée.

F. 8 + c.

1. Fol. tomentoso fl. aureo, L. 16. jacea arborea argentea.

F. 8 + b.

2. . . . duplicato pinnato fl. purp. L. 7. æ.

F. 8 + b.

3. Eadem fl. ex rubro roseo.

P. 5. 8 + a.

4. Orient. glasti fol. fl. luteo, L. 30.

P. 2. 8 + a.

5. Alpinum fol. pinnatis Calice non spinosa fl. aureo, R. 27.

E 5

6. Al-

34 *Catalogue des Arbres & Plantes Etrangères.*

Habitus Culture

- | | | |
|---------|------|--|
| P. 2. 8 | † a. | 6. Alpinum fol. pinnatis Calice spinosa fl. aureo. |
| P. 3. 8 | † a. | 7. non spinosa fl. flavo. |
| P. 3. 8 | a. | 8. foliis foliosis fl. purp. capite spinosa. |
| P. 3. 8 | a. | 9. eadem fl. pallido. |
| P. 3. 8 | a. | 10. majus fol. integris & diversis capite non spinosa, fl. purpureo. |
| P. 2. 8 | a. | 11. Majus fol. lanceolatis integerrimus fl. purpureo. |
| P. 2. 8 | † a. | 12. lati fol. Caule alato fl rubro, Capite spinoso, R. 24. |

CEPHALANTHUS, Eng. *Button wood.*

- | | | |
|------|----|-------------------------------|
| F. 8 | a. | 1. Fol. binis & ternis, L. 2. |
|------|----|-------------------------------|

CERASUS, Fr. *Cerisier*, Eng. *Cherry tree.*

- | | | |
|------------|----------|--|
| F. | f. o. x. | 1. Jamaicensis buxi folio, <i>malphigia</i> , L. 1. |
| A. 4. m | c. | 2. Hottentorum fol. rotundo Crassissimo <i>mauroce-
nea</i> R. <i>Cassine</i> , L. 2. |
| F. | a. | 3. oblongo, <i>olea</i> , R. 3. L. 2. |
| F. m † | c. | 4. humillima fol. oblongo Crasso. |
| A. 4. | c. | 5. fol. amplo oblongo, <i>arbor-
laetescens vulgo.</i> |
| A. 3. II † | a. | 6. Hortensis fl pleno <i>Prunus</i> , L. 8. γ. |
| A. 3. II † | a. | 7. Affinis mahaleb dicta <i>prunus</i> , L. 5. <i>bois de St.
Lucie.</i> |
| F. II † | a. | 8. Virgin. humilis fol. lanceolatis, |
| F. | f. c. x. | 9. Jamaicensis, fol. lanceolatis. |
| A. 4. | f. c. x. | 10. Amer. lauro <i>Cerasi</i> fol. fructu purpureo ra-
cemoso, <i>quajabara</i> , M. 1. |

CERATONIA, Fr. *Carouge*, Eng. *St. John s' bread.*

- | | | |
|-------|----|-----------------------|
| A. 4. | c. | 1. Siliqua edulis, L. |
|-------|----|-----------------------|

CEREUS, Fr. *Cierge epineuse*, Eng. *Torch-thistle.*

- | | | |
|----|-----------|--|
| F. | e. o. ff. | 1. Erectus Crassissimus spinis albis Cactus, R. 6. |
| | | 2. Erec- |

Catalogue des Arbres & Plantes Etrangères.

35

Habitus	Culture	
F.	e. o. ff.	2. Erectus gracilis spinis fuscus, fl. flavo fructu purpureo.
F. m +	d.	3. septem angularis fl. purpurascens cactus, R. 7.
		4. fructu rubro non spinoso, cactus, R. 4.
		5. altiss. spinis flavis, cactus, R. 8.
		6. polygonis spinis flavis.
		7. atroviridis spinis flavis.
		8. spinis fuscis.
F.	e. o. ff.	9. gracilis spinis albis.
		10. gracilior. spinis albis.
		11. articulatis, spinis albis, cactus, R. 3.
		12. octangularis spinis primis fuscis deinde variegatis.
		13. quadrangularis Cactus, R. 11. L. 4.
F. m +	e. o. ff.	14. gracilis polygonis, spinis fuscis, fl. albo, pyramidalis vulgo.
P.	e. o. ff.	15. gracilior, sexangularis spinis fuscis.
V. m +	e. o. ff.	16. Schandens fl. amplo Luteo, Cactus, R. 10. L. 11.
V. II +	d. f.	17. fl. pulchro purpureo, Cactus, L. 12.
V.	d. o. ff.	18. trigonis articulatis, Cactus, L. 13.
V.	d. o. ff.	19. eadem Eleganter variegato.
F.	f. o. f. x.	20. Scholopendriæ fol. brachiato, Cactus, L. 20.

CERINTHE, Fr. Melinet, Eng. Honey Wort.

P. 2. ♂	b.	1. Minor fl. flavo, R. 1.
P. 1. ♂ +	b.	2. Fol. ovatis petiolatis, R. 2. pulmonaria, L. 5. Cerinthoides argentea, B.
F. 2. ♂	b.	3. . . . linearibus hispidis, L. 3.

CHELIDONIUM MAJUS, Fr. Eclair, Eng. great felandine.

P. 2. II +	a.	1. Flore pleno.
------------	----	-----------------

CHE-

CHELONE.

- P. 2. ∞ † a. 1. Accadiensis fl. albo, L. 1.
 P. 3. ∞ † a. 2. purpureo M. appendix.
 P. 1. ∞ † a. 3. Hirsutis, L. 2.

CHENOPodium.

- F. m a. 1. Frutescens sedi minori fol. R 12. L 17.
 F. m c. 2. Caule infirmi sedi fol. Cericeis,
 L. 20.

CHEROPHYLLUM, Pr. Cerfeuil, Eng. Cow-weed.

- P. 3. ∞ a. 1. Perennis Cicutæ facie, R & L. 1.

CHIONANTUS, Eng. Snow-drop-tree.

- A. 3. II † a. 1. Virginiana lauro Cerasi fol. L. 1.
 A. 3. II † a. 2. Zeylanica Cotini fol. L. 2.

CHIRONEA.

- F. ∞ † d. 1. Fol. linearibus fl. amplo ruberrimo, R. 1.
 L. 2. Centaurium minus afric. C.

CHONDRILLA, Eng. Gum-succory.

- P. 2. ∞ † a. 1. Perennis humilior fl. Cæruleo, B. 1. lactuca,
 L. 6.

CHRYSOCOMO, Eng. Goldyloks.

- P. 2. ∞ † a. 1. Calycibus Laxis, R. 1. L. 4.
 2. Fruticoso fl. majore, R. 2. L. 1.
 3. minore.
 F. ∞ † d. 4. ante florescentiam reflexo, R. 3.
 L. 2.
 5. suffruticosis fl. aureo sæpæ gemi-
 nato, L. 3.

CHRYSOPLENium, Eng. Golden Saxifrage.

- P. 1/2. γ b. 1. Rotundi folia, L. 2.

Habitus Culture

CICHORIUM, Fr. Chicorée, Eng. Succory.

P. 2. ☉ † a. 1. Minus fol. magis lacineatis, B. 13.

CINCHONA, vel QUINQUINA.

F. e. 1. Officinalis, L.

CIRCIUM, Eng. Gentle-thistle.

P. 8. ☉ a. 1. Maximum asphoduli radice, B. 1. M. 3.

CISTUS, Fr. Ciste, Eng. Rock-rose.

F. ☉ † c. 1. Ladanifera fl. albo maculo punicante, B. 1. L. 3.
 2. Eadem fol. angustiori.
 3. Halimi folio, L. 9. æ.
 4. Salvia fol. fl. albo, R. 5. L. 7.
 5. Rosmarini fol. fl. albo, M. 7.
 6. Fol. oblongo incano fl. purp. L. 7. M. 12.
 7. . . . undulatis & Crispus fl. purp. L. 8. M. 4.
 8. . . . salvia brevioribus fl. rubro, B. 1.
 9. . . . falici angusto flore toto albo.
 10. . . . populi nigra fl. albo amplo, L. 1. æ. R. 1. M. 9.
 11. . . . rosmarini ampliore fol.
 12. . . . populi nigra fol. minore, L. 1. 6. M. 10.

CITHAREXYLUM.

A. 3. c. 1. Amer fol. ad marginem dentatis, L. 1.
 A. 3. d. 2. Afr. lauri fol. non dentato, leucoxyllum fol. laurinis alternis acuminatis, B. D. 10.

CLEMATIS, Fr. Clematite, Eng. Climber.

V. ☉ † a. 1. Cæruleo vel purpurea, R. 5. L. 1.
 2. . . . fl. pleno, B. 2. M. 9. L. 1. 6.
 3. Peregrina fl. albo, R & L. 6.
 4. Fol. pinnatis fl. ex viridis albicante, L. 5. 6. R. 3.
 5. . . . Compositis glabris, fl. albo odoratissimo L. Systema naturæ.

P. 2. ☉ † a. 6. Cærulea erecta, L. 9. M. 2.

F

7. Sive

Habitus Culture

- | | | |
|-------------|----|--|
| F. ♂ † | a. | 3. Vesicaria orient. fl. sanguineo notato, L. 1.
s. M. 3. |
| A. 4. ♂ m † | a. | 4. virg. foliolis ovatis fl. luteo, M. 6. |
| P. ♂ † | d. | 5. Herbacea Vesiculis Compressis, R & L. 3. |
| P. ♂ † | d. | 6. parva Compressa, fl. spi-
cato rubro. |

COLLINSONIA.

- | | | |
|-----------|----|--|
| P. 3. m † | a. | 1. Virginiana, L. fl. odora graviolente. |
|-----------|----|--|

COMA AUREA, Eng. Goldylocks.

- | | | | |
|--------|----|---|---|
| F. ♂ † | d. | { | 1. Afr. fol. in extremitatis trifidis, B. 4. Santolina, L. 6. |
| | | | 2. tenuiss. diviso, Santolina, L. 5. |
| | | | 3. fol Chritmi marini, B. 3. Santoline, L. 7. |

COMMELLINA.

- | | | |
|-----------|----|--|
| P. 1/2. ♂ | e. | 1. Caule repente fl. luteo, L. 2. |
| P. 2. ♂ | f. | 2. erecta fl. Cæruleo, L. 4. M. 3. |

CONOCARPODENDRON CONIFERA, vel
LEPIDODARPODENDRON.

- | | | |
|-------|----|--|
| A. 4. | d. | 1. Fol. saligno, Protea R. 16. Leucadendron, L. 4. |
| F. | d. | 2. Humilus fol. saligno hirsuto. |

CONVALARIA, Fr. Muguet, Eng. Lily of the Valley.

- | | | |
|--------------|----|---|
| P. 1/2. II † | a. | 1. Latifolio fl. amplo, M. 3. |
| P. 1/2. II † | a. | 2. pleno variegato, M. 4. |
| P. 1/2. II † | a. | 3. Flore rubente, M. 2. |
| P. 1/2. II † | a. | 4. Humilis fol. Cordato, L. 8. |
| P. 2. ♂ | a. | 5. Fol. alternis, L. 3. |
| P. 1. ♂ | a. | 6. Fol alternis Elegantiss varieg. |
| P. 2. ♂ † | a. | 7. fl. pleno, polygonatum, B. & M. 4. |
| P. 1. ♂ † | a. | 8. Floribus racemosis, L. 7. |
| P. 1/2. II † | a. | 9. Schapo nudo, L. 1. |

F 2

CON

40 *Catalogue des Arbres & Plantes Etrangères.*

Habitus Culture

CONVULVULUS, Fr. *Liferon*, Eng. *Bind-weed*.

- | | | |
|------------|---------|---|
| V. | f o. f. | 1. Radice tuberosa, L. 7. <i>bätatas americana</i> . |
| V. ♂ + | d. | 2. Canariensis fl. purpureo, R. 5. L. 10. |
| V. ♀ + | d. | 3. Schammonia dicta, R. 3. L. 3. |
| F. ♂ + | o. | 4. Major Rectus Creticus argenteis, R. 11.
L. 21. |
| F. ♂ + | e. | 5. Argenteis fruticosis fol. linearibus, L. 22.
R. 12. |
| P. ½. II + | a. | 6. Pumila argentea, fol. lanceolatis fl. albo.
B. 6. |
| V. ♂ + | c. | 7. Fol. hederæ fl. auzureo, L. 5. |
| V. ♀ + | c. | 8. . . reni formi, L. 28. <i>soldanella marina</i> . |

CONYSA, Fr. *Conise*, Eng. *Flea bane*.

- | | | |
|---------|----|---|
| P. ½. S | d. | 1. Cretica fol. molli Candidissimo, R. 2. L. 8. |
|---------|----|---|

CORALLODENDRON, Eng. *Coral-tree*.

- | | | |
|-----------|----|---|
| F. | e. | 1. Fraxini fol. pubescentibus, <i>Sophora</i> , L. 2. |
| A. 4 ♂ + | e. | 2. Am. spinosum fl. ruberrimo, M. 1. <i>Erythrina</i> ,
<i>na</i> , L. 2. |
| F. | e. | 3. spinis nigricantibus, M. 4. |
| P. 2. S + | e. | 4. Caroliniensis Radice Crassa, M. 3. <i>Erythrina</i> ,
<i>na</i> , L. 1. |
| F. | f. | 5. Am. Caudice & nervi foliorum spinosis,
M. 6. |
| F. | f. | 6. . . . non spinosum, M. 2. |

COREOPSIS, Eng. *Tiek-seeded sunflower*.

- | | | |
|-----------|----|---|
| P. 4. ♂ + | a. | 1. Virg. altissima fol. pinnatis linearibus in me-
dio atropuniceis. |
| P. 1. ♂ + | a. | 2. . . . humilis fol pinnatis linearibus fl. aureo,
L. 1. |
| P. 4. ♂ + | a. | 3. . . . fol. subternatis integerrimis, L. 2. |

CORIARIA, Eng. *Myrtle leaved sumach*.

- | | | |
|----|----|------------------------|
| F. | b. | 1. Fœmina, L. 1. M. 2. |
|----|----|------------------------|

COR

Catalogue des Arbres & Plantes Etrangères.

41

Habitus Cultuure

CORNUS, Fr. Cornouiller, Eng. Dogberry or Corneltree.

- | | | |
|-----------|----|---|
| A. 4. ☉ | a. | 1. Fœmina putate sanguineo, L. 3. |
| A. 3. | c. | 2. Amer. semper virens lauri folio. |
| A. 3. ♂ † | a. | 3. Virg. fructi albo fl. umbellato Copioso. |
| A. 4. ♀ | a. | 4. Mas, L. 2 β. |

CORNUTIA.

- | | | |
|-------|-------|----------------------------------|
| A. 4. | e. o. | 1. Fl. pyramidato Cæruleo, L. 1. |
|-------|-------|----------------------------------|

CORONA IMPERIALIS.

- | | | | | |
|--------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------------|
| B. 3. ♂ † a. | { | 1. Fl. luteo, M. 9. | } | Petilium, R.
Fritillaria, L. 1. |
| | | 2. pleno, M. 10. | | |
| | | 3. . . . rubro pleno, M. 3. | | |
| | | 4. alato Caule, M. 6. | | |
| | | 5. duplici Corona, M. 4 & 5. | | |
| | | 6. fol. lato varieg. M. 7. | | |
| | | 7. angusto varieg. M. 8. | | |
| | | 8. maximo, M. 2. | | |
| | | 9. & luteo mixto, M. 11. | | |
| | | 10. & sulphureo mixto. | | |
- & quelques autres plus ou moins différentes.

CORONA REGALIS.

- | | |
|----------------|---|
| B. 1. ♀ † d. * | 1. Racemo Comofo inferne nudo fol. Crenatis
fritillaria, L. 2. |
|----------------|---|

CORONA SOLIS, Fr. Soliel, Eng. Sunflower.

- | | |
|--------------|---|
| P. 3. ☉ † a. | 1. Virg. humilis, helianthus, L. 7. |
| P. 8. ☉ † a. | 2. Late folio fl. pleno. |
| P. 4. ♀ a. | 3. Virg. fol. lanceolatis alternis asperis. |
| P. 4. ♀ † a. | 4. Fol. lanceolatis radice repente, M. 7. |

CORONARIA.

- | | |
|--------------|--|
| P. 2. ☉ † b. | 1. Flore rubro pleno. agrostema, L. 3. |
|--------------|--|

CORONILLA, Eng. Jointed podded Colutea.

- | | | |
|--------|----|--------------------------------------|
| F. ♂ † | o. | 1. Fruticosa stipula magna, L. 4. |
| F. ♂ † | c. | 2. Hispanica frutescens major, L. 3. |

F 3

S. Fru.

42 *Catalogue des Arbres & Plantes Etrangères.*

Habitus Culture

F. ♂ + a. 3. Fruticosa, scorpioides major, L. 1. *Emerus*, B.

P. 3. ♂ + a. 4. Herbacea, fl. vario, M. 3. L. 6. plantæ perennis.

CORTUSA, Eng. *Bearf-ear fanicle*.

P. $\frac{1}{2}$. II + a. 1. Fol. ovatis sessilibus, R. 2. *verbascum fl. borragini*, B. 10.

COTINUS, Fr. *Fustet*, Eng. *Venice sumach*.

A. 3. ♂ + b. 1. Coriaria, B. *Rhus*, L. 12.

COTYLEDON. Eng. *Navel-wort*.

F. ♂ + d. ff. 1. Afr. fl. Crasso lacineato, R. 1. L. 6.

F. ♂ + d. f. 2. . . . orbiculatis limbus purp. cinctus, L. 1. æ. M. 9.

F. ♂ + d. f. 3. Eadem fol. utriusque cinereis.

F. ♂ + d. f. 4. Afr. fol. umbellato coccineo, M. 4. *Crassula*, L. 1.

F. ♂ d. f. 5. . . . Crutiatis positis fl. ex albo virescente odorato, *crassula*, R. 7. L. 5.

F. d. f. 6. . . . minoribus Crassif. viridioribus, M. 7. L. *Crassula*, R. 6. L. 4.

F. ♂ + d. f. 7. . . . longo & angusto fl. flavescente, C. tab. 23. L. 1. β.

F. d. f. 8. . . . minoribus oblongis, B. 6. *Crassula*. R. 4.

F. d. f. 9. . . . orbiculatis vel semi globati, M. 10. L. 2.

P. 1. ♂ a. 10. Major umbellatus veneris dicta, B. 1. L. 5. β. M. 1.

F. d. f. 11. Afr. Caule Crassa, fol. oblongo vel longo Lato, B. D. Tab. 18.

C R A S S U L A.

F. ♀ + d. f. 1. Altissima fl. albo umbellato odorato, R & L. 2. *aloe*, B. 12.

F. ♀ d. f. 2. Fol. subulatis, R & L. 3.

P. $\frac{1}{2}$. ♀ d. f. 3. Acaulos fol. subulatis radicatis, R. 4. L. 8.

4. Cau

Catalogue des Arbres & Plantes Etrangères.

43

Habitus	Cultuure	
P. $\frac{1}{2}$. m	d. f.	4. Caule flaccida prolifera, R. 5. L. 9.
P. $\frac{1}{2}$. m	d. f.	5. Pumila fol. planis oblongis denticulatis.
F. m	d. f.	6. Fruticoso fol. vermiculato.
P. $\frac{1}{2}$. m	d. f.	7. Acaulos fol. plano oblongo.
P. $\frac{1}{2}$.	d. f.	8. Caule flaccida repente, portulacea facie, L. 10. M. 8.
F. d. f.		9. Arbor fol. oppositis obtusis, R. 6. L. 4.
P. $\frac{1}{2}$. m	d. f.	10. Acaulos fol. plano Crasso Longissimo.
P. $\frac{1}{2}$. m	d. f.	11. Pumila fol. ovato, Crasso perforato, fl. albo umbellato.

CRATÆGUS, Fr. *Alisier*, Eng. *Wild-service*.

F. II	a.	1. Fol. subrotundo serrato subtus in canis, R. 1. L. 1 M. 2.
F. II	a.	2. Virgin. fol. tomentoso, L. 5.
F.	a.	3. oblongis serratis viridibus.
A. 3. II +	a.	4. Fol. obtusis bistrifidis, fl. pleno, <i>mespilus</i> , M. 4.
A. 3. II +	a.	5. fructu albo <i>mespilus</i> , M. 15.
A. 3. II +	a.	6. aureo.
A. 3. V +	a.	7. Spina acuta biflora germanica <i>mespilus</i> , M. 3.

CRINUM, Eng. *Lily asphodel*.

P. 2. S +	f. o. x. f.	1. Americanum, L. 3. æ. lilio asphodulis semper virens max. polyanthus albus, C. tab. 14.
		2. L. 3. β. eadem minus, C. tab. 15.
		3. majus fl. albo Caule purpureo scente.

CHRITMUM, Fr. *Bacille*, Eng. *Samphire*.

P. 2. S	c.	1. Marinum odore api, L. 1.
---------	----	-----------------------------

CROCUS, Fr. *Saffran*.

B. $\frac{1}{2}$. m	a.	1. Sativus, vel safran vera, L. 1. æ.
		2. Pyrinæus autumnalis, M. 2.
		3. Montanis autumnalis, M. 3.

A. Ve

*8 Semper virens, pyracantha
rocta, mespilus L. 2*

44 *Catalogue des Arbres & Plantes Etrangères.*
 Habitus Culture

C R O C U S.

B. $\frac{1}{2}$. v 8 + a. 4. Vernal L. 1. β . Dont on trouve chez nous une Collection de 36. especes tant soit peu differente.

C R O T U L A R I A.

P. 2. b. 1. Caroliniensis fl. Cæruleo.
 F. 8 + f. o. x. } 2. Africana styraci fol. fl. Cæruleo, L. 6. M. 3.
 3. Asiatica fol. ternatis fl. luteo, L. 10. pube-
 scente.
 4. glabra.

C U P R E S S U S, Fr. *Cipres*, Eng. *Cypres-tree*.

A. 2. a. 1. Virginiana fol. acacia deciduis, L. 2.
 F. 3 b. } 2. Meta in fastigium Convoluta, L. 1. M. 1.
 3. Ramos extra se spargens, M. 2 L. 1. β .
 4. Meta in fastigium Convoluta non fructife-
 rens.
 5. Nana fructu Cæruleo parva, L. 4.

C U R C U M A.

P. 2. f. o. x. f. 1. Fol. lanceolatis, L. 2.

C Y C L A M E N, Fr. *Pain de porcean*, Eng. *Sow-bread*.

b. 1. Hyemale fl. purpureo, M. 4.
 2. Hyeme & vere florens fl. amplo albo odorato.
 3. ba.
 B. $\frac{1}{2}$. X d. * } 4. fl purpureo, B. 2. M. 5.
 4. Eadem basi roseo.
 5. Autumnalis hederæ fol. fl. Carnæo, M. 1.
 6. roseo.
 B. $\frac{1}{2}$. m + b. } 7. albo, M. 2.
 8. fol. bipennis fl carnæo.
 B. m + b. } 9. Fol. orbiculatis estivum fl. purp. odorato ra-
 dice anemone, B. 15.
 10. Eadem radice rotundo.

C Y T I S U S, Fr. *Cytise*, Eng. *Base tresoeil*.

F. 8 + a. 1. Supinus fol. infra & filiquis molles, L. 6. α .
 A. 4. 3 + c. 2. Canariensis sempervirens, B. 10. M. 5. gen-
 sta, L. 1.
 3. Gla

Handwritten notes in cursive script at the bottom of the page.

Habitus	Cultuure	
F. ♂ +	a.	3. Glaber nigricans, L. 2. R. 2.
F. ♂ +	a.	4. Humilus glaber fl. pulchro aureo spicato.
A. 3. II +	a.	5. Alpinus racemoso fl. pendulo, L. 1. <i>Laburnum</i> .
A. 3. II +	a.	6. Eadem fl. racemoso pendulo magno, M. 1.
A. 4. ♂ +	c.	7. Ut No. 2. sed in omni parte majoribus.
F. ♂	d.	8. Calycibus hirsutis sessilibus, L. 5.

DAPHNE, Fr. *Garou*, Eng. *Mezereon*.

F. ♂	a.	1. Fl. racemoso, semper virens, R. 1. L. 5.
F. ♂ +	a.	2. Floribus sessilibus, R. 2. L. 1. fl. <i>purpureis</i> , M. 3.
F. ♂ +	a.	3. fl. <i>rubro</i> , M. 5.
F. ♂ +	a.	4. fl. <i>albo</i> , M. 4.

DELPHINIUM, Fr. *Pied d'alouette vivace*.

P. 1. ♂ +	a.	1. Fol. linearibus grandiflorum, L. 4.
P. 5. ♂ +	a.	2. . . palmatis fl. Cœruleo labi purp. fimbriato, L. 5.
P. 5. ♂ +	a.	3. Virg. altiss. fol. aconiti glabra fl. Cœruleo labi fimbriato.
P. 2. ♂ +	a.	4. Sybircum humilis fl. Cœruleo Calcaris rugosis.
P. 2. ♂	c.	5. Platani fol. staphis agriæ dicta, L. 6.
P. 3. ♂ +	a.	6. Palmatis fol. magis incis. .

DENSCANIS, Eng. *Dog's St. tooth*.

B. $\frac{1}{2}$. V +	a.	<div style="display: inline-block; vertical-align: middle;"> 1. Fl. albo, M. 1. 2. . . . suave rubento, M. 4. 3. . . . purpureo rubente, M. 2. 4. . . . purpureo. </div> <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; font-size: 3em; margin: 0 10px;">}</div> <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;"> Erithronium, R & L. </div>
------------------------	----	--

DENTARIA, Fr. *Dentaire*, Eng. *tooth-Wort*.

P. $\frac{1}{2}$. II	a.	1. Fol. omnibus ternatis. R & L. 1. M. 5.
-----------------------	----	---

G

Cic

Habitus

Cultuure

DICTAMNUS, Fr. *Origan*, Eng. *Dittany*.P. $\frac{1}{2}$. ♂ + d. 1. Creticus tomentosus, M. 1. *origanum*, L. 4.P. $\frac{1}{2}$. ♂ + d. 2. Montis sypili, M. 2. *origanum*, L. 5.DICTAMNUS ALBUS, Fr. *Fraxinelle*.P. 2. ♂ + a. { 1. Fl. albo. } L & R. 1.
2. . . , purpurascens. }

DIERVILLA.

F. II a. 1. Accadiensis fl. luteo R & M. 1. H. C. tab 7.
lonicera, L. 14.DIGITALIS, Fr. *Digitale*, Eng. *Fox glove*.F. ♂ + d. 1. Acanthoides Canariensis, L. 4. *gesneria*, R. 2.

P. 3. Ω a. 2. Angusti fol. fl. ferrugineo, L. 3.

P. 2. Ω a. 3. Foliis Linearibus floribus remotis.

P. 2. Ω b. 4. Hispanica fl. flavescente, L. 2.

DIOSCOREA.

V. f. o. x. ff. 1. Malab. fol. cordatis, L. 6.

V. a. 2. Virgin. fol. cordatis acuminatis, L. 7.

V. f. o. x. ff. 3. Zeylanica Caule bulbifero, L. 5.

DIOSMA.

F. ♂ + d. 1. Hirsutis odoratis, L. 2. M. 1. *spirea*, C.
tab. 3.F. ♂ + d. 2. Fol. subulatis acutis, L. 1. M. 2. *spirea*, C.
tab. 1.

F. X + d. 3. . . lanceolatis Ciliatis, L. 5.

F. ♂ + d. 4. . . . glabris. odoratissimo, L. 6.

DIOSPYROS, Eng. *Indian date plum*.

A. 4. a. 1. Fol. Concoloribus, L. 2. M. 2.

DODARTIA.

P. 1. Ω a. 1. Fol. linearibus, L. 1.

Habitus

Culture

D O D O N E A.

- A. 4. f. 1. Lauri oblongiore fol. Caule pubescente.
A. 4. f. 2. Lucidis ex insulæ Carai-
bianæ.

DOLICHOS, Fr. *Haricot*, Eng. *Kidney bean*.

- V. X^{\dagger} d. 1. Caule perenni lignoso fl. purp. L. 9. H. C.
tab. 20.
- V. = \dagger d. 2. floribus luteis, L. 4. H. C.
tab. 21.

DORIA, Eng. *African Ragwort.*

- | | | |
|--------|----|--|
| F. ♂ + | d. | 1. Frutescens Crassis & succulentis fol. B. 8. R. <i>othonna</i> , L. 13. æ. R. 2. |
| F. ♂ | d. | 2. . . . coronopi folio, B. 13. <i>othonna</i> , L. 12. R. 1. |
| F. ♂ + | d. | 3. Afr. hederæ terrestri fol. B. 9. <i>othonna</i> , L. 1. <i>Solidago</i> , R. 8. |
| F. ♂ | d. | 4. Fol. rigido angusto dentato. |
| F. ♂ | d. | 5. Afr. fruticoso fol. latissimo amplexi caule dentato. |

DORONICUM, Fr. *Doronic*, Eng. *Scorpion rooted*.

- P. 2. 5 a. r. Fol. cordatis obtusus, L. 1.

DORYCHNIUM, Eng. *Shrub trefoil.*

- F. ♂ c. 18. In Monspelienſis, R. I. M. I. *Lotus*, L. 15.

DRACO ARBOR, Eng. *Dragon tree.*

- A. 2. e. i. Foliis flaccidis, *Cordylene*, R. i. palma, B 6.
M. 8.

DRACOCEPHALON, Eng. *Dragon's head.*

- | | | |
|-----------|----|---|
| F. ♂ | c. | 1. Fruticoso graviolente, R & L. 1. |
| P. 2. ♂ + | a. | 2. Americ. Cornuti, R & L. 1. |
| P. 1. ♂ + | c. | 3. Fol. linearibus fl. magno Cæruleo, L. 5. <i>Ruy-
sbiana</i> , B. |
| P. 1. ♂ + | b. | 4. Pumila magno flore, L. 4. |

G 2

DRA

Habitus

Cultuure

DRACUNCULOIDES, Fr. *Serpentaire*.P. 1. Ω † e. o. x. f. 1. Fl. Coccineis, B. *hæmantbus Colchici fol.* R. & L. 2.ECHINOMELOCACTOS, Fr. *Melon-epineuse*, Eng. *Melonthistle*.

P. $\frac{1}{2}$ 8	f. o. ff.	{	1. Americana minor, B. 1. <i>Cactus</i> , R & L. 1. M. 5.
			2. major duodecem angularis, B. 2. <i>Cactus</i> , R & L. 2. <i>spinis albicantibus</i> .
			3. eadem spinis ruberrimus.
			4. minor lanuginosis, proliferis spinis albicantibus, <i>cactus</i> , M. 6.

ECHINOPUS, Eng. *Globe thistle*.

P. 1. Ω † a.	1. Pumila fl. albo, B. 4. F. <i>Echinops</i> , L. 2.
P. 3. Ω † a.	2. Major, B. 2. fl. purpurascens, <i>Echinops</i> , L. 1.
P. 2. Ω † a.	3. Floribus Corymbosis, <i>Echinops</i> , L. 4.

ECHIUM, Fr. *Viperice*, Eng. *Viper s'bugloss*.F. Ω d. 1. Afr. fruticans fol. pilosis, R. 5. L. 1.ELEAGNUS, Fr. *Olivier sauvage*, Eng. *Wild olive*.

A. 2. a. 1. Fol. molli in canis, R & L. 1.

ELICHRISUM, Fr. *Immortelle*, Eng. *Eternal flower*.

F. δ † d.	1. Frutescens fl. Corymbosis toto aureo, B. 2. <i>gnaphalium</i> , R. 11. L. 13.
F. δ c.	2. Fol. stæchados Citrina fl. aureo, R. 13. <i>gnaphalium</i> , R. 15. L. 14.
F. δ † c.	3. Afr. fol. oblongo tomentoso fl. luteo, B. 14. <i>gnaphalium</i> , R. 18. L. 26.
F. δ c.	4. subtus Cano supra viridis fl. luteo, B. 12. <i>gnaphalium</i> , R. 17. L. 23.
F. Ω † d.	5. argent. repens fl. pulchro magno, B. 15. <i>xeranthemum</i> , R. 2. L. 6.
P. 2. Ω † b.	6. Orient. fl. ignescente ex aureo Rutilante. B. 3. <i>gnaphalium</i> , R. 12. L. 21.
F. Ω † d.	7. Afr. fruticos. Caule alato fl. umbellato <i>gnaphalium</i> , L. 27.

8. Afr.

Catalogue des Arbres & Plantes Etrangères.

49

Habitus	Cultuure	
F. δ +	d.	8. Afr. fruticos. fol. parvis Crenulatis fl. albo umbellato.
P. $\frac{1}{2}$. Π +	a.	9. Montanum fl. suaviter rubento, B. 7. gnaphalium, L. 28
P. 2. δ +	a.	10. rotundiore Candido, B. 6. gnaphalium, L. 1.
F. Ω	d.	11. Fruticosum fl. singulari, gnaphalium. R. 13. L. 36
F. Ω +	d.	12. Fol. lineari fl. rubello posteo aureo, gnaphalium, B. 16. L. 20.
P. 1. Ω +	c.	13. Orient. humilis, fl. amplo toto aureo.
F.	d.	14. Afr. fruticoso fol. rotundiori parva Subtus in canis supra viridis.
F. δ	d.	17. tomentosum fol. undulatis fl. specioso, gnaphalium. B. D. tab. 80.

E P H E M E R U M.

P. 1. δ +	a.	1. Virginian. fl. azureo, B. 1. tradescantia, R & L.
P. 1. δ +	a.	2. pallido Cœruleo.

E P H E D R A.

F. Ω	a.	1. Mas, L. 1.
-------------	----	---------------

E P I M E D I U M.

P. $\frac{1}{2}$. δ +	a.	1. Alpinum, R & L.
-------------------------------	----	--------------------

E R I C A, Fr. Bruyère.

F. χ +	c.	1. Afr. arbor tenui fol. R. 4. L. 6.
P. 1. Ω +	a.	2. Vulgaris fl. albo, L. 1.

E R I O C E P H A L U S.

F. μ	d.	1. Africanis fruticosis, L. 1.
----------	----	--------------------------------

E R Y N G I U M, Fr. Panicant.

P. $\frac{1}{2}$. μ	b.	1. Pumila Caule dichotomo, R. 4.
P. 2. μ	b.	2. Ameri. Juccæ fol. R. 5. pag. 529.
P. 3. μ	a.	3. Fol. radicalibus ovalis planis Crenatis, R. 1.
P. 3. μ	a.	4. Eadem Caule & flore amathystini, B. 5.

G 3

Euo-

Habitus

Cultuure

ERYSIMUM, Fr. Tortelle.

P. 1. ⑤ † a.

1. Barbarea fl. luteo pleno pulcherrimo.

EUONIMUS, Fr. Fusain.

A. 4. II a.

1. Vulgare fol. variegatis.

A. 4. II a.

2. Latifolio, B. 2. L. 1. β.

A. 4. II a.

3. Fol. ovato dentato Caule rigido fl. ex viridis rubello.

V. a.

4. Virgin. schandens lauri folio.

A. 4. II a.

5. Vulgaris, L. 1. æ.

EUPATORIUM, Fr. Eupatoire.

P. 4. III a.

1. Urtice fol. Canad. fl. albo, R. 2.

P. 4. III † a.

2. Nova angliaæ urtici fol. rugosis fl. albo amplo.

V. c.

3. Caule volubili, R. 4. L. 2.

P. 4. III † a.

4. Virg. fol. ternis & quaternis fl. purp. R. 3. L. 11. β.

P. 6. III † a.

5. . . eadem in omni parte majoribus, L. 11. æ.

P. 5. III † a.

6. Fol. digitatis, R. 1. L. 10.

EUPHORBIA.

F. Ω

e. o. ff.

1. Aculeata semi nudo, R. 1. L. 7. *nerii fol.* B. 11.

F.

f. o. ff. x.

2. . . . triangulari ramos spargens, R. 2. L. 1. æ. *schaddi d'acalli dicta.*

F.

e. o. ff.

3. . . . erectis, L. 1. æ.

F. Ω

e. o. ff.

4. . . . quadrangularis & quinquang. R. 3. L. 2.

F.

e. o. ff.

5. Heptagonum spinis longiss. in apice frugiferis, B. 4. R. & L. 3.

F. Ω

f. o. x f. *

6. Cereii effigui Caulibus Crassioribus, L. 6.

F.

f. o. ff. *

7. Cotini. folio, R. 11. L. 14. *titbymalus*, B. 27.8. Curassav. myrti ampliori fol. R. 10. L. 12. æ. *titbymalus*, B. 1.

9. Poly.

Catalogue des Arbres & Plantes Etrangères.

51

Habitus	Cultuure	
F. Ω +	e. o. ff.	9. Polygonum spinosum Caule tuberibus orna- to, R. 6. L. 4.
F. Ω +	d. f.	10. Caule squamato tuberoso, B. 6. fl. albicante, L. 8. æ.
F.	f. o. x. f. *	11. Curassavica lauro Cerasi folio, M. 2. L. 8. æ.
F. Ω +	d. f.	12. Caule squamoso minus, B. 7. fl. viridi, L. 8. β.
P. 1. Ω +	d. f.	13. Eadem Capite medusæ effigui, R. 7. L. 8. δ.
F.	d. f.	14. Caule squamoso in fini rami-se spargens. L. 8. ζ.
P. 1. η +	d. f.	15. erecta, fl. ex albo & roseo mixto, B. D. tab. 7. fig 2.
F.	e. f.	16. Volubilis.
P. 1/2..	d. f.	17. Capite medusæ effigui, hu- millima ramis proliferis, B. D. tab. 9. fig. 1.
F.	f. o. f.	18. Fili formi erecta, L. 11.
F.	e. o. f.	19. Volubilis, L. 9.
F.	e. o. f.	20. flaccida, L. 10.
P. 1. Ω +	b.	21. Characias amygdaloides, L. 54.
P. 2. Ω	b.	22. Umbella multifida, L. 49.
P. 2. Ω	b.	23. Afr fruticosa oblongo folio.
P. 1/2. Ω	b.	24. Fol. pini, L. 56. R. 23.
P. 1/2. Ω	b.	25. Sylvaticus lunata flore, L. 55. <i>tithymalus</i> , B. 37.
F. Ω	e. f.	26. Afr. Caule Coralli Colore, L. 44. <i>tithyma-</i> <i>lus</i> , B. 14.
F. Ω	d. f.	27. Indicus frutesc : pentaphyllos <i>tithymalus</i> , B. 28.
F. Ω +	d. f.	28. Orient. salice fol. fl. magno, R. 28. <i>tithyma-</i> <i>lus</i> , B. 31.
F. γ +	b.	29. Arboreus fol. glauco angusto, L. 46. <i>tithy-</i> <i>malus</i> , B. 6.
F. II	b.	30. Fol. lini rotundiori, L. 29. β. <i>tithymalus</i> , B. 38.
F. II	c.	31. acutiori, L. 29. æ <i>acuta</i> .
		32. Fru-

Habitus

Cultuure

F. ♂

d.f.

32. Fruticosus fol. parvis lanceolatis Capsula villosa.

P. 1. ♂

a.

33. Characias amygdaloides fol. Eleg. varieg. titbymalus, B. 3.

F A B A G O.

P. 3. ♂ → a.

1. Belgarum, B. 1. zygothylum, L & R. 1.

2. Afr. fl. sulphureo fructu rotundo, B. 2. zygothylum, R. 2 L. 3.

F. ♂ +

d.

3. . . . luteo fructu globoso, B. 3. zygothylum, L. 4 fabago, B. D. tab. 3. fig. 1.

4. . . . arborescens, B. D. tab. 3. fig. 2. zygothylum, L. 2.

5. ramis longissimus fl. aureo.

FAGOPYRUM, Fr. Ble sarasin.

V.

d.

1. Schandens lignoso, fol. lanceolatis, polygonum, L. 18.

FAGUS, Fr. Hetre.

A. 2.

a.

1. Fol. atro puniceis.

FERULA, Fr. Ferule.

F. m

d.

1. Galbanifera vera semper virens fol. & caule rore Cæruleo cinctus, B. 5. bubon, R & L. 2.

P. 2. m

c.

2. . . . fol. myrhidis, B. 9. bubon, R. 4. L. 3.

P. 3. m

a.

3. . . . foliolis pinnatifidis, R & L. 4.

FICOIDES, B. Mesymbreanthemam, R & L.

F. ♂

d.f.

1. Spinis ramosis fl. Cæruleo, B. 18. R. 3. L. 17.

F. ♂

d.f.

2. Fl. umbellato obsoleti Coloris, R. 4. L. 16.

F. ♂ +

d.f.

3. Fol. varieg. aspero fl. violaceo, B. 11. R. 5. L. 10. æ.

F. ♂ +

d.f.

4. Caule lanuginoso fl. violaceo, B. 8. R. 7. L. 11. æ.

5. Ca

Habitus	Cultivare	
F. Ω +	d.f.	5. Caryophylli fol. fl. luteo magno, B. 1. R. 2, L. 35.
P. $\frac{1}{2}$. δ +	d.f.	6. Acaulus Crass. latiss. & lucidis fol. fl. aureo amplo, B. 5. R. 8. L. 34. β .
P. $\frac{1}{2}$. δ +	d.f.	7. lucidis fl. aureo, B. 7. L. 34. γ .
P. $\frac{1}{2}$. δ +	d.f.	8. lucidis difformis fl. aureo, B. 9. L. 34. δ .
P. $\frac{1}{2}$. Ω	d.f.	9. fol. lanceolatis planis fl. amplo albo, R. 11. L. 7.
P. $\frac{1}{2}$. δ +	d.f.	10. bellidi florum, B. 13. L. 8.
F. $\frac{1}{2}$. π +	d.f.	11. eadem in omni parte majoribus.
F. π +	d.f.	12. Fol. glauco perfoliato apice spinoso, fl. Cæruleo, B. 17. R. 16. L. 14. ϵ .
F.	d.f.	13. Cortice lignoso Candido, B. 15. L. 14. α .
F. δ +	d.f.	14. Fol. securi formi fl. aureo stellato, in medio nocto aperto, B. 14. R. 17. L. 32.
P. $\frac{1}{2}$. π	d.f.	15. Acaulos fol. semi Cylindræo fl. aureo, R. 23. L. 26.
F. δ +	d.f.	16. Frutescens fl. phæniceo filamentis atris, R. 30. L. 24.
P. $\frac{1}{2}$. δ +	d.f.	17. Acaulos fol. triangulari brevi Crasso dentato fl. aureo, B. 12. <i>riatum felinum referens</i> , L. 31. ϵ .
P. $\frac{1}{2}$. Ω +	d.f.	18. fol. triang. longissimo fl. aureo ad solem aperto, R. 12. L. 31. <i>riatum Caninum dictum</i> .
P. $\frac{1}{2}$. Ω +	d.f.	19. fol. triang. prope summittate dentato fl. luteo.
P. $\frac{1}{2}$.	d.f.	20. fol. aspero ad apicem stella spinosa ornato, L. 10. β .
F. π +	d.f.	21. Fl. amplo luteo extus linea rubro picta, B. 6. R. 21. L. 29. α .
F. $\odot \rightarrow$	d.f.	22. Noctu florens odoratissimo, B. 1. R. 28. L. 4.
F. Ω	d.f.	23. Neapolitana fl. Candido, B. 15. R. 22. L. 3.
		H 24. Fol.

54 Catalogue des Arbres & Plantes Etrangeres.

Habitus	Culture	
F. Ω +	d. f.	24. Fol. triang. schabro tenui fl. violacco, B. 23. R. 20. L. 13.
P. ♂ +	d. f.	25. longo tenui fl. auranteo, B. 5.
F. Ω +	d. f.	26. coccineo, B. 7. R. 26. L. 17.
F. ♂ +	d. f.	27. aspero fl. violaceo, B. 24.
F. Ω	d. f.	28. tereti glauco apice purp. Crasso, fl. aureo, B. 3. R. 24. L. 27.
F. η	d. f.	29. triang. fructu maximo eduli, B. 3.
F. η	d. f.	30. ensiformi fl. ampliff. purp. B. 4. R. 18. L. 21.
F. ♂	d. f.	31. acini formi fl. purp. filamentoso, R. 5. R. 19. L. 20.
F. Ω +	d. f.	32. dorso lato parum excavato, B. 9. fl. violaceo, L. 9. γ.
F. Ω +	d. f.	33. ad tres margine aculeato, B. 21. R. 14. L. 9. β.
F. Ω	d. f.	34. glauco breviff. admargine non spinoso, fl. violaceo, B. 22.
P. $\frac{1}{2}$. Ω +	d. f.	35. Fol. tereti procumbens fl. violaceo, B. 6. L. 19.
F. II +	d. f.	36. triang. Erecta fl. luteo magno, B. 7. R. 27. L. 28.
F. $\frac{1}{2}$.	d. f.	37. Repens fol. triangulari longissimo, L. 29. β.
F. Ω +	d. f.	38. Fruticoso fol. tereti fl. suave rubento.
F. Ω +	d. f.	39. longissimo fl. aureo amplissimo.
F. ♂ +	d. f.	40. fl. intus aureo foris purpureo, L. 22.
F. ♂ +	d. f.	41. Cauli infirmi fl. albo umbellato, L. 5.
F. Ω +	d. f.	42. fol. triquetris lateribus planis fl. violaceo.
F. Ω +	d. f.	43. Humillima fruticoso, fol. triang. brevi fl. pulchro violaceo.
F. Ω +	d. f.	44. Caule infirmi fol. Calendulæ fl. aureo, B. 3. R. 10. L. 30.
F.	d. f.	45. Fruticosis fol. planis linearibus.
P. $\frac{1}{2}$. Ω +	d. f.	46. Caule infirmi fol. retuso, fl. Eleg. Carnæo.

F 17

Habitus Culture

FICUS, Fr. *Figuier*.

- | | | |
|-------|----------|---|
| A. 3. | f. o. x. | 1. Folis nymphe, R. 1. L. 2. |
| A. 4. | e. o. | 2. Malabarensis fol. Cuspidato, R & L. 3. |
| A. 3. | e. o. | 3. Bengalensis fol. subrotundo, R & L. 4. |
| A. 4. | e. | 4. . . . lanceolatis. R & L. 5. β. |
| A. 4. | b. | 5. Fructu maximo purp. B. 1. } L. 1. |
| A. 4. | b. | 6. . . . albo, B. 2. |
| A. 4. | f. o. x. | 7. Fol. ovatis integris fruc. racemoso, L. 6. |

FILIX, Fr. *Fougere*.

- | | | |
|--------------------|----|---|
| P. $\frac{1}{2}$. | d. | 1. Amer. humilis fronde duabis, nova species. |
|--------------------|----|---|

FILUPENDULA, Eng. *Meadow sweet*.

- | | | |
|-----------|----|---|
| P. 2. ∞ | a. | 1. Fol. pinnatis, R. 1. <i>Spiræa</i> , L. 9. |
| P. 2. ∞ + | a. | 2. Eadem fl. pulcherrimo pleno. |
| P. 4. ∞ | a. | 3. Foliolis impari trifido, R. 2. <i>Spiræa</i> , L. 10. |
| P. 4. ∞ + | a. | 4. Eadem fl. pulcherrimo pleno, M. 2. |
| P. 2. ∞ | a. | 5. Foliis ternis, R. 3. <i>Spiræa</i> , L. 11. <i>Hypecacus antha dicta</i> . |

FRAGARIA, Fr. *Fraisier*.

- | | | | |
|--------------------|----|---|---|
| P. $\frac{1}{2}$. | a. | { | 1. Caule decumbente, L. 3. |
| | | | 2. Chilensis fructu maximo monstroso fol. varieg. |
| | | | 3. L. 1. y. |
| | | | 4. Americana fr. maximo glabra. |
| | | | 5. Alpinum, semper florens & fructiferens. |

FRANGULA.

- | | | |
|----------|----|---|
| A. 4. II | a. | 1. Alnus nigra baccifera, B. <i>Rhamnis</i> , L. 3. |
|----------|----|---|

FRAXINUS, Fr. *Frene*.

- | | | |
|----------|----|---|
| A. 2. II | a. | 1. Caroliniensis plumosis, L. 2. |
| A. 1. | a. | 2. Ex nova anglæ, pinnis foliorum in mucronum productioribus, L. 3. |

H 2 4

FRI

Habitus

Cultuure

FRITULARIA, Fr. fritillaire.

- B. 2. II b. 1. Radice rotundo, R. 1 L. 3. *lilium persicum*.
 B. 2. II + a. 2. R 2 L 5. Dont on trouve chez nous une
 Collection de plus que 100 Especies, tant
 soit peu differente.

FUMARIA, Fr. Fume-terre.

- P. $\frac{1}{2}$. 8 + a. 1. Schapo nudo, R & L. 1.
 P. $\frac{1}{2}$. 8 + a. 2. Semper virens fl. albo, B. 5. L. 4.
 P. $\frac{1}{2}$. 8 + a. 3. . . . luteo, B. 6.
 P. $\frac{1}{2}$. 8 a. 4. Radice Cava major, R 2. L. 3. æ.
 P. $\frac{1}{2}$. 8 + a. 5. . . . non Cava fl. rubello, L. 3. β.

GALE, Eng. Candleberry myrtle.

- A. 3. II c. 1. Caroliniensis baccifera, B. 1. *myrica*, L. 2.
 F. II a. 2. Odoratissimo septentrionalis, *myrica*, L. 1.

GALANTHUS, Fr. Perce neige.

- B. $\frac{3}{2}$. v + a. { 1. Trifolium minus, R & L. *leucoium bulbosum*
 minus, B.
 2. Eadem fl. pleno.

GALEGA.

- P. 3. 8 + a. { 1. Fl. Candido, B. 2. L. 1.
 2. . . . cæruleo, B. 1.

GALENIA.

- F. 8 d. 1. Frutescens, odorato, R & L.

GALEOPSIS.

- P. 2. 8 a. 1. Alpina betonice fol. fl. rubro maculato,
 B. 14.
 P. 2. 8 + a. 2. Urtice fol. fl. luteo maculato, B. 10. L. 4.
 P. 2. 8 + a. 3. Eadem fol. Eleg. varieg. B. 11.

GALLIUM, Fr. Caillelait.

- P. 2. 8 + a. 1. Fol plurimis linearibus fl. luteo, R. 1. L. 11.
 P. 2. 8 a. 2. . . . nervosis fl. albo, R. 8. L. 16.
 P. 1. 8 a. 3. . . . parvis fl. albo, *Crutiata*, B. 2.

GE

Catalogue des Arbres & Plantes Etrangères.

57

Habitus Cultuure

GENISTA, Fr. Genet, Eng. Broom.

- | | | |
|--------|----|---|
| F. ♂ + | b. | 1. Hispanica fl. luteo odorato, B. 1. M. 1. <i>spartium</i> , R & L. 1. |
| F. ♂ + | b. | 2. pleno, M. 13. |
| F. ♂ + | a. | 3. Tinctora germanica, R. 1. L. 4. M. 7. |
| | | 4. austriaca maxima, M. 6. |
| | | 5. Lusitanica, M. 4. |
| | | 6. Schoparia, <i>spartium</i> ; R. 4. L. 7. |
| | | 7. Lucensis, M. 10. |
| | | 8. Ramis triangularis, R & L. 2. |
| | | 9. Tinctora germanica maxima, M. 5. |

GENTIANA, Fr. Gentiane, Eng. Felwort.

- | | | |
|------------|----|---|
| P. 3. x + | a. | 1. Major lutea officinalis, R & L. 1. |
| P. 2. x + | b. | 2. Latifolia fl. punctato, B. 7. swertia, R & L. 1. |
| P. 1. II + | a. | 3. Alpina magno flore, B. 4. R. 5. L. 8. |
| P. 1. ♂ + | a. | 4. Floribus confertis terminatricibus, R. 4. L. 20. |

GERANIUM, Fr. Bec de grue, Eng. Crane's bill.

- | | | |
|-----------|----|---|
| F. ♂ + | d. | 1. Afr. frutescens alchimillæ hirsuto fol. fl. rubro magno, B. 17. R. 24. L. 7. |
| | | 2. alchimillæ fol. fl. rubicundis, L. 11. |
| | | 3. eadem fol. Eleg. varieg. B. 3. M. 30. |
| | | 4. fol. alchimillæ fl. rubello purpurascens. |
| | | 5. Eleganter kermosino. |
| | | 6. ex pallide luteo varieg. fl. kermosino. |
| | | 7. fl. Elegantiss. kermosino, L. 3. |
| P. 1. ♂ + | d. | 8. . . . myrhydus folio fl. magno striato, L. 5. β. |
| F. ♂ | d. | 9. . . . Coriandri fol. fl. magno striato, L. 5. |
| | | 10. . . . noctuolens tuberosum & nodosum, R. 27. L. 3. |

H 3

II. Afr.

Habitus	Cultuure	
F. ♂	d.	11. Afr. fol. Crasso glauco fl. suave rubento, R. 19. L. 10.
F. ♂ +	d.	12. . . . inferiori asari, superiore staphidis agriæ, R. 27. L. 9.
F. ♂	d.	13. . . . eordatis lobatis Crenatis pilosis, R. 21. L. 13.
F. 1. ♂	d.	14. . . . molli Crasso, odoratissimo, R. 29. L. 15.
F. ♂ +	d.	15. . . . alceæ fl. coccineo fulgidissimo, R. 23. L. 2.
B. 1. m	d.	16. . . . noctuolens vitis folio, R. 18. L. 1.
F. ♂	d.	17. . . . fol. alceæ fl. albo semper florens, B. 25.
		18. . . . noctuolens myrhidis fol. fl. albicante, L. 1. y. M. 36.
B. 1. m	d.	19. . . . anemone fol. fl. rubello, B. 11.
		20. . . . pastinace fol. fl. pallido, B. 12. } L. 1. β.
F. ♂	d.	21. . . . malvæ lacineato fol. odoræ Melisse, B. 7. L. 12.
P. 1. ♂ +	d.	22. Hæmatodes fl. variegato, L. 38. β.
P. 1. ♂	d.	23. Afr. fol. orbiculatis pilosis fl. albo, R. 30. L. 14.
P. 1. ♂	a.	24. Pumila aconiti fol. fl. rubro, L. 28.
P. 1. ♂ +	a.	25. Fol. dissectus maximo flore Cæruleo. } L. 35.
		26. . . . pallido. }
P. 3. ♂ +	a.	27. Batrachoides fl. Cæruleo, M. 1. } L. 29.
		28. . . . variegato, M. 3. }
P. 2. ♂ +	a.	29. Phæum fl. ferrugineo, L. 26. β.
		30. . . . pallide rubello, L. 26.
B. 1. m	d.	31. Afr. noctuolens ut No. 19. sed folio glabro.

GLADIOLUS, Fr *Glaïeul*, Eng. *Cornflag*.

B. 2. ♂ + c.*	1. Maculam Rhomboideam inscriptus, R. 1. L. 1. H. C. tab. 6.
B. 3. ♂ c.*	2. Afr. fl. sulphureo.
B. c.*	3. . . . caule maculato.
B. 2. ♂ + c.*	4. . . . calice lutescente, petalæ rubello Eleg. maculato, fol. linearibus.
B. 1. ♂ + c.*	5. . . . fl. amplo albicante.

6. Afr.

Habitus Cultuure

- | | | | |
|---------|------|------|---|
| B. 1. ♂ | + | c. * | 6. Afr. fl. amplo cinereo. |
| B. 2. ♂ | + | c. * | 7. . . Caule sparsa fl. albicante roseo, R. 4.
L. 5. |
| B. 3. ♂ | b. | | 8. . . fl. purpureo, M. 3. |
| B. 4. ♂ | c. * | | 9. Maximus indicus, M. 6. |
| B. 3. ♂ | b. | | 10. Bisantinum major fl. purp. M. 4. |
| B. 2. ♂ | b. | | 11. Fl. Carnæo, M. 2. |
| | | | 12. . . albo. } L. 1. |
| | | | 13. . . purpureo. } |

GLORIOSA, R & L.

- R. V. m + f. o. x. ff. 1. Lilium Zeylan. superbum, methonica mal-
barorum.

GOSSYPIMUM, Fr. Cotton, Eng. Cotton.

- F. m f. o. x. { 1. Arboreum, L. 3.
2. Fruticosum, L. 2. perennis.

GRAMEN.

- P. 4. m a. 1. Latiori fol. Eleg. varieg. phalaris, L. 3. p.
P. 3. m a. 2. Angustiore Eleg. varieg. folio.

GRANADILLA, Fr. Fleur de la passion, Eng. Passion flower.

- V. e. 1. Fol. oblongo serrato, passiflora, R & L. 1.
V. f. o. x. 2. . . tricuspidi obtuso & oculato, B. 9. passi-
flora, B. 2.
V. m + b. { 3. Pentaphyllos fl. Cæruleo, B. 1. M. 2.
4. latioribus fol. fl. Cæruleo
magno, B. 2. M. 1. passiflora, R. 4. L. 42.
R. 3. m + e. 5. Triphyllos fl. roseo Clavato, M. 4. passiflora,
R. 5 L. 21.
R. V m + a. 6. Fol. tricuspidi fl. parvo flavescente, M. 5.
passiflora, R. 7. L. 15.
V. m + b. 7. Pentaphyllos fl. albo magno, B. 7.
V. m e. { 8. Fol. amplo tricuspidi fr. olivæ formæ, M. 11.
passiflora, R. 6. L. 16.
9. . . angusto trifido, fl. parvo gemino, M. 12.
passiflora, L. 16. p.
10. Ha

60 *Catalogue des Arbres & Plantes Etrangères.*

Habitus

Culture

V. $\text{nx} \dagger$

e. o.

10. Fol. hastato, fl. ex purp. & luteo Variis,
M. 14. *passiflora*, R. 8. L. 17.

GROSSULARIA, Fr. *Grosselier*, Eng. *Goosberry*.

F. II

a.

1. Virginiana fructu spinoso, *Ribes*, L. 8.

GUAJABARA, Eng. *Sea-side grape*.

A. 4.

g.

1. Fol. subrotundis, M. 3. R. pag. 534. *uvifera*,
H. C. *polygonum*, L. 26.

GUAJACUM, seu LIGNUM VITÆ.

A. 4.

e.

1. Lentisci fol. fl. Coccineo, L. 3.

GUAJAVA, Fr. *Goiave*, Eng. *Guava*.

A. 4. $\text{nx} \dagger$ f.

1. Alba dulcis, M. 1. *psidium*, L. 1. β .
2. Rubra acida, M. 2.

GUIDONIA.

A. 4. $\Omega \rightarrow \dagger$ d.

1. Ulmi fol. fl. roseo, M. 1. *Grewia*, L. 1.

GAURA.

P. 8. nx

a.

1. Fol. lanceolatis fl. pallide rubello.

HALLERIA, Eng. *African fly honeysuckle*.

F. nx .

c.

1. Fl. ruberrimo, R & L. 1. α .

HAMAMELIS, Eng. *Witch hazel*.

A. 4. χ

a.

1. Coryli folio, L. 1.

HÆMANTHUS, Eng. *Blood-flower*.

B. $\frac{1}{2}$. $\text{nx} \dagger$ d. *

1. Afr. lingui fol. schapo uniflora, L. 1.
2. undulatis.

HÆMATOXYLON, Eng. *Campechy-wood*.

F.

f.

1. Seu Lignum Campechianum, R & L. 1.

HEBENSTRETIA.

F. II $\text{nx} \dagger$ d.

1. Fol. dentatis, L. 1.

HE-

Habitus Culture

HEDERA COMMUNIS, Fr. *Lierre*, Eng. *Ivy tree*.

- F. a. 1. Minor fol. ex albo Eleg. varieg. B. 5. M. 3.
 F. II a. 2. Arborea fructiferens, M. 2.
 F. II b. 3. fol. ex albo Eleg. variegatis.

HEDYSARUM, Eng. *French honeysuckle*.

- P. I. Ω + e. 1. Fol. simplicibus ovatis, R. 1. L. 5.
 P. 3 Ω + b. { 2. Clypeatam fl. suaviter rubente, R. 5. L. 28.
 3. albedo, B. 4. M. 2.
 P. 3. η + b. 4. Triphyllum Canadensis fl. purp. L. 16.
 M. 4.
 P. 3. η + d. 5. Caule frutescente, fl. rubro;
 L. 17.

HELENIA, Eng. *Willow Leaved sun flower*.

- P. 8. ⊖ + a. { 1. Fol. linearibus, M. 1. } *belenium*, L. 1.
 2. . . . lanceolatis, M. 2.

HELEANTHEMUM, Eng. *Dwarf cistus*.

- P. 1. Ω + c. { 1. Orient. olea fol. fl. albo.
 2. aureo. } *cistus*, L. 26.
 3. pallide rubello.

HELICTERES.

- F. e. o. 1. Fol. Cordato serrato, L. 1.

HELIOCARPOS.

- F. η + f. o. x. 1. Americana, L. 1.

HELIOTROPIMUM, Fr. *Herbe aux verrues*, Eng. *Turn sole*.

- F. ♂ + e. o. { 1. Fruticosum, spicis Conjugatis odore vanillas,
 2. simplicibus, Tournefortia,
 L. 5.

HELLEBORINE, Fr. *Elleborine*, Eng. *Bastard hellebore*.

- P. 1. Ω a. 1. Latifolia, B. 1. M. 1. *serapias*, L. 1. x.
 P. 1. Ω a. 2. Angusti folia, B. 4. *serapias*, L. 1.

1

HEL.

62 *Catalogue des Arbres & Plantes Etrangères.*

Habitus Cultuure

HELLEBORUS, Fr. *Ellebore*, Eng. *Christmas flower*.

- P. 2. ☉ a. 1. Niger foetidus, L. 4.
P. 1. X a. 2. . . . fl. viridi, L. 3.
P. $\frac{1}{2}$. ≈ † a. 3. . . . albo vel roseo, L. 2.
P. 2. II † a. 4. . . . luteo globoso, R. 5. *trollius*, L. 1.

HEPATICA, Eng. *Noble Liverwort*.

- P. $\frac{1}{2}$. X † a. { 1. Fl. Cæruleo, M. 1.
2. . . . pleno, M. 2.
3. . . . rubro pleno, M. 5.
4. . . . albo vel Carnæo, M. 3.
5. . . . rubro, M. 4. } hepaticæ R.
anemone,
L. 1.

HERMANNIA.

- F. ♂ † d. { 1. Fol. oblongo ferrato, R. 3. L. 4.
2. . . . latiore, R. 1. L. 3.
3. . . . ibici hirsuto fl. aureo, R. 2. L. 1.
4. Eadem fl. primo aureo deinde purpureo ru-
bello.

HERMODACTYLUS, Eng. *Snakes-head iris*.

- B. 1. II † b. 1. Fol. quadrangulare, B & M. *iris*, R. 12.
L. 15.

HERNANDIA, Eng. *Jack in a box*.

- A. 2. f o. x. 1. Amplo hederæ folio, umbilicato, R & L. 1.

HEUCHERIA.

- P. 1. II a. 1. Fl. squallide purpureis, R & L. 1.

HIBISCUS.

- P. 3. ≈ b. 1. Populi fol. fl. roseo, R & L. 1.
A. 4. ♂ † e. 2. Fl. miniato Clauso, R. 2. L. 8.
A. 4. e. { 3. Chinensis fl. simplici, R. 3. L. 7.
4. . . . pleno, B. 6.
F. ♀ † e. 5. Papaya fol. fl. magno flavescente fundo pur-
pureo, L. 13.
P. 2. ≈ b. 6. Ut, No. 1. fl. albo.

7. Ame-

Habitus	Cultuure	
F. \times +	e.	7. American. fol. Cordato - quinquangularibus omnium maximum.
F. \times +	e.	8. . . . fol. Cordato - quinquang. villosis. Caule maculato fl. amplo sulphureo.
F.	e.	9. Zeylanica Caule spinoso, R. 7. L. 10.
F.	e.	10. Fol. Cordato subrotundo, L. 4.
F. \times +	e.	11. . . quinquangularibus, fl. amplo flavo pendente, L. 16.

HIERATIUM, Eng. *Hakweed.*

P. 1. ♂ +	c.	1. Pulchrum ramosum lanuginosum, R. 3. L. 24.
P. 1. ♂ +	a.	2. Pilosum fl. coccineo, R & L. 9.
P. 1. ♂	a.	3. Alpinum maculatum, fl. luteo, L. 4.
P. 5. ♀	a.	4. Altissima fol. lanceolatis fl luteo.
P. $\frac{1}{2}$. ♂	a.	5. Alpinum pumilum fl. magno aureo, L. 3.

HURA, Eng. *Sand-box-tree*.

A. 2. f. o. x. 1. Abutili fol. R & L.

HYACINTHUS, Fr. & Eng. *Jacintbe.*

B. 1. 8	a.	1. Corollis Campanulatis fl. albo,	} R. 3. L. 1.
		M. 2.	
B. 1. 8	a.	2. carnæo,	
		M. 3.	
B. 1. 8	a.	3. Cæruleo,	}
		M. 1.	
B. $\frac{1}{2}$. 8 +	d. *	4. . . . oblongis, suaviter rubento, L. 2.	
B. $\frac{1}{2}$. II +	a.	5. Floribus paniculatis monstrosis, R. 5. L. 7.	
B. $\frac{1}{2}$. 8	b.	6. Muscari fl. ex Cæruleo virescente,	} L. 6. R. 4.
B. $\frac{1}{2}$. 8	b.	7. luteo virescente,	
		8. Stellatis fl. Cæruleo.	
		9. delute Cæruleo.	} Schilla, R. 4. L. 6.
B. $\frac{1}{2}$. 7 +	a.	10. Carnæo.	
		11. ex albido	
		12. fuave rubento.	
B. $\frac{1}{2}$. 8	a.	13. Botrioides obsoleto Cæruleo, R. 1. L. 12.	
B. $\frac{1}{2}$. 8	a.	14. albo, R. 6. L. 9.	

12

15. Bo-

Habitus

Cultuure

B. $\frac{1}{2}$. 8

a.

15. Botrioides fl. carneo.

16. Cæruleo. } R. 6. L. 12.

B. 1. 8

a.

17. Corallis Campanulatis amethystini, L. 4.

B. $\frac{1}{2}$. 8 +

d.

18. Afr. fl. pendulo coccineo oris flavis.

B. $\frac{1}{2}$. 7

a.

19. Flore borragini.

B. 1. 8 +

b.

20. Orientalis, R. 2. L. 5. Dont on trouvera ci
aprez un denombrement des plus beaux &
plus precieux Especies qui sont Connue
Jusqu'ici en Hollande, & dont on peut
avoir annuellement les Catalog. specificque
avec leur plus bas prix.

HYDRANGEA.

F. 8 +

a.

1. Virg. fl. umbellato, L. 1.

HYDROPHILLON, Eng. *Water Leaf*.P. $\frac{1}{2}$. II

a.

1. Morini, R & L. 1.

HYOCYAMUS, Fr. *Jusquiane*, Eng. *Hen-bane*.

F. 8 +

d.

1. Creticus luteo major, R. 3. L. 3. æ.

HYPERICUM, Fr. *Millepertuis*, Eng. *St. John's Wort*.P. $\frac{1}{2}$. 8 +

b.

1. Orient. fl. magno, R. 7. L. 6.

P. 2. 8 +

a.

2. Ascyron dictum Caule quadrangulati, R. 4.
L. 13.P. $\frac{1}{2}$. 8 +

a.

3. Fastidum frutescens, R. 9. L. 8.

F. 8 +

a.

4. Canariensis multiflorum, R. 8. L. 7.

F. 8 +

a.

5. Fructu baccato, R. 3. L. 5.

P. 8 +

a.

6. Amer. magnum banisteri.

HYPOPHREA, Eng. *Sea-buckthorn*.

F. II

a.

1. Salice folio Mas, L. 1.

HYSSOPUS, Fr. *Hisope*.

P. 2. 8 +

b.

1. Arabum Rubro flore, L. 1. 8. M. 3.

P. 1. 8 +

b.

2. Spicus interruptis. R. 1. dracocephalum, L. 4.
Ruysebiana, B & M.

P. 1. 8

a.

3. Lopanthus, L. 2.

4. Flo

15. Malabaricum, lauri fol. fl. albo pleno odora-
tissimo, gardenia, dicta.

15

JA-

ra ci
ux &
nnue
peut
cque

R. 4.

L. 4.

Flo.



A. Delfos fecit.

*JASMINUM Mallabaricum Lauri fol.
fl: albo pleno,*

Van Hazen Excuv.

Habit
P. 2
P. 2

F. 5

F. 5

F. 5

R. 4

R. 3

R. 4

F. 5

F. 5

F. 8

F. 8

A. 4

F. 8

F. 8

F. 8

65

15

JA-

JATROPHA, Eng. *Physic-nut.*

F.	f. s.	1. Americana gossipi fol. R. 1. L. 3.
F. $\text{m} \dagger$	f. s.	2. multifido, fol. R. 2. L. 4.
F. $\text{m} \dagger$	f. s.	3. lactescens & urens, L. 3. L. 6.
F. m	f. s.	4. staphidis agriæ fol. R. 5. L. 1.

IBERIS, Eng. *Sciatica Cress.*

F. $\delta \dagger$	b.	1. Fol. Cunei formibus, R & L. 1.	} thlaspi semper virens.
F. $\delta \dagger$	c.	2. Eadem fol. Eleg. varieg. B. 2.	
P. $\frac{1}{2}$. $\text{II} \dagger$	a.	3. Fol. linearibus, R & L. 2.	

ILEX, Fr. *Chenevert*, Eng. *Ever-green-oak.*

A. 4.	b.	1. Cocciglandifera, M. 5. <i>quercus</i> , R. 8. L. 6.
		2. Fol. lanceolatis
		3. . . . agrifolii, M. 3.
		4. . . . oblongo ferrato, M. 2. L. 3.

IMPERATORIA, Eng. *Master-Wort.*

P. 2. S	a.	1. Major, R. L & M. 1.
------------------	----	------------------------

INDIGOPHORA, Eng. *Indigo.*

F. δ	f. o.	1. Fruticoso filiqua falcata, L. 1. M. 2.
-------------	-------	---

IPOMEA.

V.	e. x.	1. Solani fol. fl. roseo, L. 9.
----	-------	---------------------------------

IRIS, Fr. *Flambe*, Eng. *Flower de luce.*

R. 2. $\text{S} \dagger$	b.	1. Susiana fl. maximo, L. 1. M. 6.
B. $\frac{1}{2}$. $\gamma \dagger$	b.	2. Persicum fl. variegato, R. 13 L. 17. <i>Xiphon</i> , M. 1.
P. 2. S	b.	3. Alba florentina, M. 4.
P. 2. $\text{S} \dagger$	a.	4. Latifolio petalis ex atro purp. & albo striato B. 4. M. 11.
P. 3. $\text{S} \dagger$	a.	5. Latifol. petalis repandis atro purp. viet. Erectus obsolete purpurascens, B. 8 M. 5.
P. $\frac{1}{2}$. δ	a.	6. Humilus fl. purpureo, B. 21. L. 14. <i>Chamaeris dicta</i> .
		7. H.

geres. 67

3. L. 14. Chæ-

4. mæiris dicta.

B. 17. Caule trian-

riato, B. 18.

trumque variis

ex rubro, roseo,

neo rubro & luteo

andis albis, Erec-

ifloro folio unico

e orto.

albescente.

aureo & purp. va-

eo.

striatis, M. 33.

o odorato, M. 53.

suave, M. 27.

ont on trouve une

tant soit peu dif-

quelles on trouve

ction de plus que

ravissante.

albis, L & M.

ut.

insculpto, M. 6.

2. Amer:

66/67

3

idell

5.5

5.9

6.

1.

fem
rens

6.

6.

6.

6.

6.

6.

6.

Xipb

6.

6.

riato

6.

viet

B.

ama

7. E



IRIS imberbibus
caule multifloro folio
unico lineari, ex
summo caule orto

A. Delfos del. et Sculp.

Catalogue des Arbres & Plantes Etrangères. 67

Habitus	Cultuure	
P. 1. 8	a.	7. Humilus fl. variegato, B. 23. L. 14. Chæ- 8. albescente, B. 24. mæiris dicta.
P. 1. 8	a.	9. Angusti fol. fl. Cæruleo, B. 17. Caule trian- gulari.
P. 3. 8 +	a.	10. Cæruleo striato, B. 18. 11. utrumque variis B. 19.
B. 2. 8 +	b.	12. Bulbosa hispanica fl. pleno ex rubro, roseo, & albo mixto.
B. 2. 8 +	b.	13. fl. pleno ex coccineo rubro & luteo mixto.
P. 1. 8 +	e.	14. Afr. Caule sparsa petalis repandis albis, Erec- tus Cæruleo notato.
R. 3. 8	d.*	15. . . . Corallifera fl. Cæruleo.
B. 1/2. +	d.*	16. . . . imberbis, Caule multifloro folio unico lineari, ex summo Caule orto.
B. 1/2. 8	d.*	17. . . . uni fol. fl. parvo flavo albescente.
B. 1/2. 8	d.*	18. . . . pumila fl. ferrugineo.
P. 1. 8 +	b.	19. Latifolia humilior, fl. ex aureo & purp. va- rius, M. 36.
P. 2. 8 +	a.	20. Sybirica, fl. pulchro purpureo.
P. 2. 8 +	a.	21. Latifolia belgica fol. Eleg. striatis, M. 33.
P. 1. 8 +	a.	22. Virg. pumila fl. purp. Cæruleo odorato, M. 53.
P. 2. 8 +	a.	23. Latefolio fl. Cæruleo odore suave, M. 27.
P. 2. 8	a.	24. Germanica, M. 28. L. 2.
B. 2. 8 +	b.	25. Bulbosa hispanica dicta, dont on trouve une Collection de 50 Especies tant soit peu dif- ferente.
B. 2. 8 +	b.	26. Bulbosa anglia dicta, des quelles on trouve aussi chez nous une Collection de plus que 50 Especies d'une beauté ravissante.

I T E A.

P. 8 +	a.	1. Virginiana floribus spicatis albis, L & M.
--------	----	---

JUGLANS, Fr. Noyer, Eng. Walnut.

P. 2. II	a.	1. Amer. nigra fructu oblongo profundissimo inculpto, M. 6.
----------	----	--

2. Amer.

Habitus

Cultuure

- | | | |
|----------|----|--|
| A. 4. II | a. | 2. Amer. alba fructu minore Cortice glabr
M. 9. |
| A. 2. II | a. | 3. . . . nigro fr. rotundo profundissimo
sculpto, M. 5. |
| A. 4. II | a. | 4. . . . alba fructu minimo putamine teneri
re, M. 10. |

JUNIPERUS, Fr. Genevrier.

- | | | |
|----------|----|--|
| A. 3. II | b. | 1. Virgin. fol. inferioribus Juniperinum, supe
rioribus Cupressam referentibus, R. 3. |
| A. 3. II | b. | 2. . . . toto Juniperino, M. 3. |
| A. 2. | c. | 3. Bermudiana, R. L & M. 5. |
| A. 4. II | a. | 4. Vulgare, mas, L. 8. |
| | | 5. . . . foemina, L. 8. |
| A. 4. II | b. | 6. Virg. baccis albis. |
| A. 4. II | b. | 7. Major, baccis rufescente, M. 8. L. 1. |
| A. 4. II | b. | 8. . . . , fructu flavescente, M. 13. L. 9. |

I X I A.

- | | | |
|-------------------------------|------|---|
| B. $\frac{1}{2}$. 6 | d. * | 1. Gramen tomentosum pumilum dictum, R
L. 1. |
| P. 2. Ω + | b. | 2. Fl. rubro & luteo Eleganter punctato, L. |
| B. 1. 6 + | d. * | 3. . . . aureo maculis purp. insignito. |
| B. $\frac{1}{2}$. 6 + | d. * | 4. . . . sulphureo, ad tres petalæ maculato. |
| B. 1. Ω | d. * | 4. Afr. Cæpæ fol. fl. pallido sulphureo. |
| B. 2. Ω + | d. * | 6. . . . Caule bulbifera fl. toto albo. |
| B. 2. Ω + | d. * | 7. albo extus violaceis |
| B. 2. Ω + | d. * | 8. cinereis. |
| B. $\frac{1}{2}$. Ω + | d. * | 9. . . . fl. amplo coccineo. |
| B. $\frac{1}{2}$. Ω | d. * | 10. . . . fol. lineari fl. Cæruleo parvo. |
| | | 11. amplo. |
| | | 12. . . . fol. palmæ fl. Cæruleo. |
| | | 13. purpureo. |
| | | 14. pallide purp. |
| | | 15. purp. holoserico. |
| | | 16. fl. Cæruleo maculis C
cineo insignito. |

eo.

orato.

s.

nter bulla.

ange dicta.

obvallatis,

I. *Cacalia*,M. 2. *Caca-*

alia, L. 4.

is.

gis.

ardus ame-

enatis, Ca-

abies, R. 4.

atis obtusis

La




W. van Hazeen Excu



*ixia afr. fol. palmatis fl. Caruleo
maculis Coccineo insignito.*

W. van Hæften Excud.

A. Delfos Sculp.



Hal

B

A.

R.

A.

F.

F.

F.

F.

F.

P.

P.

P.

P.

A

Habitus Culture

- B. $\frac{1}{2}$. Ω + d.* { 17. Afr. iridis fol. fl. amplo pallido roseo.
18. parvo albicante
19. . . . fol. palmæ hirsutis fl. roseo odorato.
20. . . . iridis folio fl. Cæruleo Elegans.
21. Cæruleo pallido.

K A L M I A.

- A. 3. b. 1. Semper virens lauri fol. fl. Eleganter bullatis, L. 2.

K Æ M P H E R I A.

- R. Ω + f.o.x. 1. Fol. ovatis sessilibus, R & L. 1. galange dicta.

K I G G E L A R I A.

- A. 3. \times c. { 1. Mas, R & L 1.
2. Fœmina, R & L. 1.

K L E I N I A.

- F. e.o.f. 1. Caule Carnoso petiola truncatis obvallatis, R. 1. M. 4. *cacalia* L. 1.

- F. \times + d.f. 2. Fol. lanceolatis planis, R. 1. M. 1. *Cacalia*, L. 3.

- F. d.f. 3. . . . planis oblongis ovatis, R. 2. M. 2. *Cacalia*, L. 2.

- F. \approx + d.f. 4. . . . Carnosis lanceolatis, R. 3. *cacalia*, L. 4. *Senecio*, C tab. 40.

- F. d.f. 5. Fruticosis fol. Carnosis vermiculatis.

- P. $\frac{1}{2}$. \approx + d.f. 6. Pumila fol. Carnosis ovatis oblongis.

- P. 8. \approx a. 7. Caule herbaceo fol. subcordato, nardus americana procerior, *Cacalia*, L. 5.

- P. 6. \approx + a. 8. . . . Elipticis subcrenatis, *Cacalia*, L. 5.

L A M I U M, Eng. *Dead-nettle*.

- P. 1. δ a. 1. Fl. albo fol. variegato.

L A R I X, Fr. *Melese*, Eng. *Larch*.

- A. 1. a. { 1. Fol. deciduo, Conifero, M. 1. *abies*, R. 4. *pinus*, L. 7.

- { 2. Amer fol. deciduo, Conis ovatis obtusis nigra

- { 3. Syberiensis.

K

L A

L A S E R P I T I U M.

- | | | |
|---------|------|---|
| P. 2. ☿ | † a. | 1. Lucidum, B. 2. |
| P. 2. ☿ | a. | 2. Foliolis ramosis sessilibus, L. 3. R. 2. |
| P. 2. ☿ | a. | 3. Extremis lobulis breviter multifidis. |

L A T H Y R U S.

- | | | |
|---------|------|---|
| R. V. Ω | † a. | 1. Perennis fl. purpureo majore, L. 18. |
| R. V. Ω | a. | 2. minore, B. 2. |
| R. V. Ω | a. | 3. vicia fol. fl. luteo, L. 16. |

L A U R U S, Fr. *Laurier*, Eng. *Bay tree*.

- | | | |
|----------|----------|---|
| A. 3. ♀ | c. | 1. Americana, R. 2. L. 5. <i>Cinnamomum spuria</i> |
| A. 3. | c. | 2. Caroliniensis fol. acuminaris, R. 5. L. 7. <i>Borbonica dicta</i> . |
| A. 3. | c. | 3. Latifolio, M. 7. & 8. <i>nobilis vulgo</i> , L. 4. |
| A. 3. II | b. | 4. Vulgaris, R. 1. M. 1 & 2. |
| A. 4. | c. | 5. . . . fol. Eleganter varieg. B. 5. M. 3. |
| A. 3. II | b. | 6. Foliis undulatis, B. 8. M. 4. & 5. |
| A. 4. II | c. | 7. Tenui folio, B. 9. M. 6. & 7. <i>baccifera dicta</i> . |
| A. 3. II | b. | 8. Racemifera foemina. |
| A. 4. | b. | 9. Cerasus fol. varieg. <i>Padus</i> , R & M. 1. |
| A. 4. ☿ | a. | 10. . . . lusitanica minor, <i>Padus</i> , M. 5. R. 3. <i>prunus</i> , L. 3. |
| A. 4. ☿ | a. | 11. . . . fol. lanceolatis, <i>Padus</i> , M. 4. R. 2. <i>prunus</i> , L. 4. |
| A. 4. | b. | 12. Fol. integris trilobisque, L. 10. M. 11. <i>Sassafras officinarum</i> . |
| A. 4. | f. o. x. | 13. . . . enervi ovatis obtusis, L. 11. <i>Winteranus Canella alba officin.</i> |

L A V E N D U L A, Fr. *Lavande*, Eng. *Lavender*.

- | | | |
|---------|------|---|
| P. 1. ☿ | a. | 1. Angusti fol. fl. albo, B & M. 4. |
| F. ♂ | † c. | 2. Fol. pinnatis dentatis, R & L. 3. <i>stæchas</i> , B. 2. |
| F. ♂ | † c. | 3. . . . lanceolatis spica Comosa, R & L. 4. <i>stæchus</i> , B. 1. |

4. Fol

Habitus Culture

- F. ♂ + d. 4. Fol. tenuis dissectis spico multiplici, M. 7.
P. I. ♂ a. 5. Angusti fol. fl. Cæruleo, M. 2. L. 1.

LENTISCUS.

- A. 4. II c. } 1. Vulgaris mas, M. 1. B. 2. } Pistacia, R.
2. fœmina, M. 2. B. 1. } 3. L. 5.
F. II c. 3. Omnium minimum.

LEONURUS, Fr. Queue de lion, Eng. Lion's tail.

- F. m + c. 1. Sederitis fol. fl. phæniceo, R & M. 1. phlo-
mus, L. 12.
F. ♀ + d. 2. Nepetæ fol. fl. phæniceo, B. 2. M. 3. phlomis,
L. 11.
F. ♀ + d. 3. Afr. ablinthi fol. fl. rubro.

LEUCANTHEMUM, Fr. Marguerite, Eng. Ox eye daisy.

- F. ♂ d. 1. Canar. fol. glauco Crasso, M. 6. Chrysanthemum, R. 6. L. 1.
P. I. ♂ + c. 2. Pumila fol. glauco pinnatifidis fl. amplissimo.
P. 2. ♂ a. 3. Tanacetæ fol. fl. majore, B. 10.
P. I. ♂ a. 4. Bellidis ferrato folio fl. amplo, chrysanthemum, L. 3.
P. I. ♂ c. 5. Fruticoso fol. pinnatis, Crisanthemum, L. 12.

LEUCOIUM, Fr. Giroflier, Eng. Stock gilliflower.

- F. ♂ + c. } 1. Arbor in canum fl. albo pleno, }
M. 8. }
2. rubro pleno, }
M. 7. }
3. varieg. } Cheirantes
pleno. } R. 3. L. 4.
4. purp. pleno, }
M. 6. }
5. varieg. }
pleno. }
F. II + c. 6. latefolium fl. pleno ex atro ex aureo
Mixto.
F. II + c. 7. angustifolium fl. pleno ex atro & au-
reo Mixto.

K 2

8. Ar

72 *Catalogue des Arbres & Plantes Etrangères.*

Habitus

Cultuure

F. II + c. 8. Arbor fol. Eleg. variegatis fl. luteo pleno, M. 26.

F. 8 + c. { 9. . . . fol. viridi fl. albo pleno, M. 16.
10. . . . rubro pleno.
11. . . . incanum fl. pleno ferrugineo Coloræ,

LEUCOIUM BULBOSUM, Fr. *perceniege*.

B. 1. X + a. 1. Bulbosum majus, B. 2. *leucoium*, L. 1.
B. 2. II a. 2. . . . multiflorum, *leucoium*, L. 2.

LIGUSTRUM, Fr. *Troêne*, Eng. *Privet*.

A. 4. 6 + a. { 1. Foliis ex aureis variegatis, M. 3.
2. Semper virens, M. 2.
3. Foliis ex argenteis varieg. M. 4.
4. Vulgare, M. 1. L. 1.

LILAC.

A. 4. II + a. { 1. Fl. Cæruleo, M. 1. } *syringa*, L. 1. R. 1.
2. . . . albo, M. 2. }
F. 8 + a. { 3. Persarum fl. Cæruleo, M. 6. } *syringa*, R. 2.
4. . . . albo, M. 8. } L. 2. æ.
F. 8 + b. 5. . . . fol. Lacineato, M. 7. *syringa*, R. 3.
L. 2. β.
A. 4. II + a. 6. Fl. saturate purpureo, M. 3.

LILIUM, Fr. *Lis*, Eng. *Lily*.

B. 3. 9 + a. { 1. Album fol. varieg. M. 5. B. 2. }
2. fl. pleno. }
3. maculato, B. 3. } *lilium*, L. 1.
4. flore pleno, B. 4. M. 2. } *Lirium*, R. 1.
5. fl. variegato, B. 19. }
M. 6. }
B. 2. 9 + a. { 6. Croceum majus, M. 7. }
7. polyanthos, }
M. 22. } *lilium*, L. 2.
8. fol. Eleg. } *lirium*, R. 2.
varieg. M. 20. }

9. Mar.

Catalogue des Arbres & Plantes Etrangères. 73

Habitus

Culture

	9.	bisantinum miniatum, B. 16. M. 18. L. 4. æ.
	10. polyanthos, B. 12. M. 17. L. 4. β.
B. 3. Ω + a.	11. fl. flavo maculis nigris, M. 19.
	12.	floribus reflexis albis, B. 9. M. 13.
	13. punctatis, B. 8. M. 12.
B. 4. η + a.	14. purp pleno M. 14.
	15. luteis punctatis, L. 6.
B. 3. η + a.	16.	canadensis maior pumila canadensis mi- nor & plusieurs autres especes tant soit peu differente dont on trou- ve annuellement le specification, aux Catalog. des oignons.

Martagon vulgo.

LILIO ASPHODILUS, Fr. Lis-asphodele,
Eng. Day lily.

R. 3. Ω + a.	1. Luteis, B. 1. hemoracallis, M. 1. L. 1. æ.
R. 1. Ω + a.	2. Puniceis, B. 2. hemoracallis, M. 2. L. 1. β.
	3. Fl. albo magno hemoracallis, L. 2. lilia- strum, B.

LILIO GLADIOLUS.

B. 2. Ω + d. *	1. Fol. quadrangularis biflorus noctu odorato.
	2. multiflora noctu odorato.
	3. fl. ferrugineo Coloræ.

LILIO-HYACINTHUS, Fr. Lis-facinthe.

B. 1. Ω + b.	1. Fl. Cæruleo, B. 1. schilla, R. 2. L. 4.
	2. purpureo magno schilla, R. 2. L. 4.

LIMONIUM, Eng. Sea Lavender.

P. 1. ♂ + d.	1. Peregrinum aspleni fol. B. 7. M. 6. statice, R. 3. L. 13.
F. η d.	2. Lignosum gallum ferens, B. 6. M. 7. statice, R. 3. L. 11.
P. 2. Ω + a.	3. Maritimum majus, B. 1. M. 1. statice, L. 1. æ.

K 3

4. Cau-

Habitus

Cultuure

P. 2. Ω † b.

P. 1. m d.

P. 1. 6 a.

4. Caule nudo ramoso, M. 2. *statice*, L. 1. γ.

5. Afr. parvum fol. rosmarini tenuiore.

6. Gramineum globosum fl. albo *statice*, L. 1.7. . . . rubra *statice*, L. 1.LINGUA CERVINA, Fr. *Langue de Cerf*,
Eng. *Hart's tongue*.

P. 1. II a.

1. Multifido folio, B. 10. *asplenium*, L. 3. ε.2. Fol. undulato, B. 5. *asplenium*, L. 3. γ.3. . . . maximo, supra in amplas lacineas foliaceis Explicato, B. 15. *asplenium*, L. 3. ζ.4. Officinarum, *asplenium*, L. 3. æ.LINUM, Fr. *Lin*, Eng. *Flax*.

P. 2. 6 c.

P. 3. δ † c.

P. 1. δ † c.

1. Perennis major Cæruleo, B. 6. L. 2.

2. . . . luteum, B. 7. R. 3. L. 14.

3. . . . afr. fol. Conjugatis & ternis, R. 4. L. 15.

LIQUIDAMBAR, Eng. *Liquid storax tree*.

A. 4. b.

1. Foliis palmato angulatis, R & L. 1. M. 1.

LITHOSPERMUM, Fr. *Herbe aux perles*, Eng. *Gromil*.

P. 2. 6 a.

1. Erectum, L. 1.

LOBELIA, *floscardinalis dicta*.

P. 2. Ω † b.

1. Maxima coccineo spicato flore, R. 1. L. 10. *Rapuntium*, M. 1.

P. 4. υ † b.

2. Omn. max. fl. spicata Coccineo, *rapuntium*, M. 7.

P. 2. Ω † a.

3. Fl. dilute Cæruleo, R. 4. L. 11. *rapuntium*, M. 2.LONICERA, Eng. *Honeysuckle*.

F. Ω a.

1. Floribus Capitatis, androssemi folio, R. 1. L. 11.

2. Fol.

Catalogue des Arbres & Plantes Etrangères.

75

Habitus Culture

- V. 6 + b. 2. Fol. supremis Connatis, inferioribus petiolatis, R. 2. L. 2. periclymenum virg fl. coccineo semper virens & florens, B.
- A. 4. 6 a. 3. Fructu gemino rubro, R. 10. L. 8.
4. nigro, L. 4. R. 7.
5. Cæruleo, M 5.
6. Fol. glabris Cordatis, L. 5.
7. Fructu gemino parva nigro.

LOTUS, Fr. Lotior, Eng. Birds-foot trefoil.

- P. 4. 12 b. 1. Villosa fl. glomerato, R. 1. L. 12. M. 1.
- F. 6 + d. 2. Cretica argentea fl luteo, R. 3. L. 10. M. 3.
- F. 6 d. 3. Fl. luteo purpurascens ex insula St. Jacobi, R. 6. L. 9. M 5.
4. Fruticoso Capitulis hirsutis. R. 2. L. 11.

LUNARIA, Eng. Honesty.

- P. 1/2. 6 a. 1. Siliqua globosis, R. 2 M. 7.
- P. 1. 6 + b. 2. Leucoli fol. filigua oblonga majori, R. 4. M. 4. Alyssum, L. 7.

LUPINUS, Fr. Lupin.

- P. 3. 6 a. 1. Virginiana perennis fl. Cæruleo, L. 1. M. 7.

LUPINASTRUM.

- P. 2. 6 a. 1. Fl. ex albido, trifolium, L. 9.

LYCHNIS.

- P. 2. 6 + a. 1. Quæ behen album fl. pleno, B. 29.
- P. 2. 6 + b. 2. Ocemastrum fl. albo pleno, B. 18. M. 6.
- P. 3. 6 + a. 3. Calcedonicum fl. pleno miniato, B. 12. M. 11
- P. 2. 6 + a. 4. Saponaria fl. pleno, B. 26. M. 12. Saponaria: R. 1.
- P. 2. 6 + a. 5. Viscosa angusti fol. fl pleno, B. 41. L. 3.
- P. 1. 6 + a. 6. Flore lacineato pleno, B. 47 L. 2. β.
- P. 1. 6 a. 7. albo simplex.
- P. 3. 6 + a. 8. Behen album similis Caule Erecto.
- P. 2. 6 + a. 9. Ocemastrum purpurea multiplex, M. 7.

10. Caug

Habitus

Cultuure

P. 2. ∞

a.

10. Caule ramoso, fructu globoso, *cucubalus*, L. 1.

P. 1. ∞ †

a.

11. Bessen album vulgo, M. 13. *cucubalus*, L. 2.

P. 2. ∞

a.

12. Viscosa, fl. muscoso, *cucubalis*, L. 10.LYCIUM, Eng. *Boxthorn*.

F. m

c.

1. Fl. ex albo purpurascens, R & L. 3.

2. atro purpureo, L. 1. R. 2.

3. Fol. linearibus Latis fl. purp.

4. tenuiore.

5. lanceolatis.

6. linearibus Latis fl. Cæruleo amplo.

7. Cortice albido.

LYSIMACHIA, Fr. *Corneille*, Eng. *Loose strife*.

P. 2. m †

b.

1. Semper virens fol. blattariæ, B. 3.

P. 2. m

a.

2. Fol. quaternis fl. Luteo, L. 5.

LYTRUM.

P. 4. m †

a.

1. Vulgare purpureo, R. 1.

MAGNOLIA, Fr. *Laurier Tulipier*, Eng. *Laurel-leav'd tulip tree*.

A. 2.

b.

1. Fol. ovato Lanceolato fl. ingente Candido, M. 2. L. 1. β.

2. oblongo fl. albo, M. 3. L. 1. ε.

A. 4.

b.

3. Lauri fol. subtus albicante, M. 1. L. æ.

A. 2.

b.

4. Amplissimo fl. albo fructu Coccineo, M. 4. L. 1. δ. *umbrella dicta*.MAJORANA, Fr. *Marjoleine*, Eng. *Marjoram*.

F. ∞

d.

1. Nobilis odoratissimo, B. 1. M. 3. *origanum*, R. 4. L. 5.

P. 1. ∞

a.

2. Rotundi fol. odorato, M. 2. B. 2. *origanum*, L. 1.MALUS VIRGINICA, Eng. *Crab tree*.

A. 3. II

a.

1. Fol. angulatis floribus odoratis, M. 3.

MAL

Habitus Culture

MALVA, Fr. *Mauve*, Eng. *Hollyhock*.

- P. 8. $\text{m} \dagger$ b. 1. Rosea fl. pleno subluteo, M. 10.
 P. 6. $\text{O} \dagger$ b. 2. Virginiana fl. amplo rubro *Lavatera species*.
 P. 8. $\text{m} \dagger$ a. { 3. Rosea fl. pleno aureo.
 4. atro Rubento.

MANDRAGORA, Eng. *Mandrake*.

- P. $\frac{1}{2}$. II b. 1. Fructu aureo odoratissimo, R. L. & M. 1.

MARANTHA, Eng. *Indian arrow-root*.

- R. 3. m g. o. x. f. 1. Cannacori folio, M. R. & L. 1.

MARRUBIUM, Fr. *Marrube*, Eng. *Horehound*.

- F. δ d. 1. Fruticoso fol. Cordato subrotundo, R. 2.
 L. 6.
 F. m c. 2. rotundo Candidissimo, R. 4.
 P. 3. m a. 3. Album vulgare, R & L. 5.

MARTYNIA.

- R. 2. $\text{m} \dagger$ g. o. x. f. 1. Fol. ferratis, L. 1. H. C. tab. 18.

MARUM, Eng. *Mastich*.

- F. O b. { 1. Syriacum, M. 1. *teucrium*, R. 2. L. 12.
 2. foliis quasi maculato.
 3. Vulgare, *Mastichina*, M. *Satureja*, L. 4. *Thymus*, R. 3.

MATRICARIA, Eng. *Feverfew*.

- P. 2. $\delta \dagger$ b. 1. Orient. fol. matricariæ Vulgaris fl. plenissimo.

MEADIA, Eng. *American Cowslip*.

- P. $\frac{1}{2}$. $\text{O} \dagger$ a. { 1. Caroliniensis fl. rubro, M. *dodecatheon*, L.
 2. roseo, M. *dodecatheon*, L.

MEDICAGO, Eng. *Moon trefoil*.

- A. 4. $\delta \dagger$ c. 1. Frutescens incana, R. 6. L. 1.
 L.

R. Pro

Habitus

Cultuure

P. 2. ♂ +

c.

2. Procumbente Leguminis Cochleatis, R. 2.
L. 8.

P. 4. ♂

a.

3. Caule prostrato flavo flore, R & L. 6.

MELIANTHUS, Fr. *Meleante*, Eng. *Honey-flower*.

F. ♀ +

c.

1. Major, R. L. & M. 1.
2. Minor, R. L. & M. 2.MELISSA, Eng. *Garden balm*.

P. 3. ♀

a.

1. Hortensis, L. 1.

P. 1. ♀

a.

2. Pedunculus axillaribus, L. 2.

MELOPEPO, Eng. *Squash*.

V.

g. o. x.

1. Zeylanica fol. hibisci molli odorato.

MENIS PERMUM, Eng. *Moonseed*.

V. m

a.

1. Canadensis umbilicato folio, L & R. 1.

MEMORDICA, Eng. *Male balsam-apple*.

V.

f. o. x.

1. Zeylanica radice perenni.

MENTHA, Eng. *Mint*.

F.

c.

1. Arborea fol. ovato Crenato, R. 8. L. 10.

2. Fol. ex argenteis varieg. M. 7.

P. 2. ♀

a.

3. . . . aureis varieg. M. 8.

4. . . . Crispus, L. 1.

5. . . . piperitica, L. 4. M. 2.

MERCURIALIS, Eng. *Mercury*.

F. ♂

c.

1. Fruticosa incana testiculata, R. 3. L. 3.
M. 6.]

MESPIUS.

F.

c.

1. Peregrinis fol. lanceolatis.

MILIUM.

P. 2. ♀

a.

1. Flosculis Confertis, R.

P. 3. m

g. o. x.

2. Maxima semina, ex insula St. domingo.

Habitus Culture

MIMULUS.

P. 2. ☉ + b. 1. Canadensis fl. Cæruleo, L. 1.

MIMOSA, Fr. *Sensitive*.

F. nx + g. o. x. { 1. Frutescens spinosa sensibilis, L. 14. L. 4.
2. tenui fol. sensibilis, L. 11.
F. nx f. o. x. 3. non sensibilis, R. 12. L. 17.

MOLLECLUSII.

F. d. 1. Fol. pinnatis, B & M. *schinus*, L. 2.

MOLY, Eng. *Wild garlick*.

B. 3. ☉ a. 1. Major fl. albo, M. 1. { *allium*, L. 2.
B. 3. ☉ b. 2. purpureo, M. 3. {
B. 1. ☉ a. 3. Minor fl. luteo, M. 4. *allium*, R. 1. L. 26.

MONARDA, Eng. *Ozweega-tea*.

P. 3. ☉ + a. 1. Fl. purpureo, R. L. & M. 1.
P. 2. ☉ + a. 2. coccineo, L. 2.
P. 3. ☉ a. 3. albo.
P. 1. nx + d. 4. Luteo, R & M. 2. L. 4.

MORUS, Fr. *Meurier*, Eng. *Mulberry tree*.

F. f. 1. Amer. spinosis, lignum sulphureo tinctorio;
L. 7.
F. b. 2. Virg. pumila fol. magis dissectis.
A. 4. a. 3. Fructu albo, L. 1.

MUSA, Eng. *Plantain tree*.

F. nx + g. o. x. { 1. Pisang maxima fructu Cucumerino, M. 1.
2. Caule maculis nigris, M. 2. fructu
odorato.

MYRICA, Eng. *Candleberry myrtle*.

F. d. 1. Fol. subcordatis ferratis, R. 4. L. 5.
F. c. 2. oblongis oppositis sinuatis, R. 3. L. 4.
L. 2 3. Ea

Habitus

Cultuure

F.

c.

3. Eadem fol. hirsutis, R. 3. L. 4.

F.

b.

4. Fol. lanceolatis utrumque acuminatis, L.

2. 3. M. 3.

5. dentatis obtusis, L. 3. M. 4.

F. II

a.

6. fructu

sicco mas.

7. fructu

sicco femina.

L. 1. M. 1. voyez ci-
devant gale No. 2.

MYRHIS.

P. 3. 5

a.

1. Perennis alba fol. hirsuto sem. aureo, T.

MYRTHUS, Fr. *Mirte*, Eng. *Myrtle*.

A. 4. 12 + c.

1. Zeylanica, B. 13. L. 4. *myrtoides*, R.

2. Balsamica fol. mali granatæ, B. 3. M. 9.

3. Caule rubente odore Citri, M. 7. B. 3.

A. 4. 12 + c.

4. Latifolia romano, B. 4. L. 1. 9. M. 2.

5. fl. pleno, B. 7. M. 6.

6. batica, B. 5. M. 10. L. 1. 3.

F.

e.

7. Batica fol. parvis rotundioribus.

c.

8. Buxi ampliori folio, B. 8. M. 4.

d.

9. . . . breviori folio, *bonquet mirte vulgo*.

c.

10. Minor vulgare, B. 9. M. 3. L. 1. 7. *tarentina*
vulgo.

d.

11. Eadem fol. Eleg. variegato, M. 11.

d.

12. Fol. minimus & mucronatis *rosmarini angustifolio*.

d.

13. . . . mucronatis flosculis rubris Candidis, M.
5. L. 1. 2.

A. 4. 12 +

d.

14. Eadem fol. ex albo Eleg. varieg. B. 12.
M. 13.

d.

15. Fol. mucronatis angustis per intervallæ Cri-
statis

c.

16. . . . amplissimis binis vel ternis, Lauri fol.
vulgo, M. 1. L. 1.

c.

17. Eadem in apice aureis notato.

A. 4. 12

c.

18. Fol. rotundiori, *Lauri nobili fol. vulgo*, L.
1. 7.

19. Fol.

Catalogue des Arbres & Plantes Etrangères.

81

Habitus Culture

- A. 4. ∞ + { c. 19. Fol. acutiore reflexis, fol. *Corniculati* vulgo.
c. 20. multiflorum ex semen Lauri fo-
lio degener.
d. 21. Batica, fructu niveo.

N A P E A.

- P. 2. a. 1. Fol. profundo dissecto, L. 2.

N A R C I S S U S.

- B. $\frac{1}{2}$. γ + a. 1. Junci fol. fl. tubam referente, R. 4. L. 3.
M. 35.
B. $\frac{1}{2}$. γ + a. 2. Parvus totus Luteis, B. 2. M. 5.
B. $\frac{1}{2}$. γ + a. 3. Eadem quadruplo minore, *nana minima*
vulgo.
B. $\frac{1}{2}$. γ + b. 4. Parvus totus flavus fl. pleno, M 7.
B. 1. γ + a. 5. Fl. plenissimo partim flavis partim viridibus,
B. 19. M 10.
B. 1. γ + a. 6. Parvus ut No. 2. sed quadruplo majoribus.
B. 1. γ + b. 7. Orientalis polyanthos fl. plenissimo, albican-
te & luteo mixto.
B. 1. γ + b. 8. fl. albicante & luteo
mixto Calice pleno major.
B. 1. γ + b. 9. eadem minor.
B. 1. γ + d.* 10. Constantinopolitanis fl. pleno, M. 37.
B. 1. γ + b. 11. Orientalis polyanthos, *Narcisse abouquets, tes-*
cettes, ou *Troscarnisse*. Dont on on trou-
ve chez nous un assortiment de plus que
100 Especies tant soit peu differente, d'une
beauté acheve, etant Leur noms & Cou-
leurs annuellement specifié aux Catalogue
des oignons.

NEREUM, Fr. Laurier rose, Eng. Oleander-or rose bay.

- A. 4. ∞ + e. { 1. Flore rubro, M. 1. L. 1. B. 1.
2. albo, M. 2. B. 2.
3. carnaeo odorato, M. 3. B. 3.
4. varieg. odorato pleno, M. 4. & 5. B.
4. & 7.
5. fol. ex aureo
Eleg. varieg.

L 5

6. Fol.

Habitus

Cultuure

F. ♂ †

f. o. x.

6. Fol. oblongis fl. pulchro purpureo, *vinca ar. borea.*NICOTIANA, Fr. *Tabac*, Eng. *Tabacco*.

F. ♂ †

c.

1. Fruticoso perennis angusti folio, M. 3.

P. 2. ♂ †

d.

2. Humilis perennis, latiori & oblongiori folio

NYSSA, Eng. *Tupele tree*.

F.

b.

1. Pedunculis multifloris, M. 1. L. 1.

OCYMUUM, Fr. *Basilic*, Eng. *Basil*.

F. m

e. o.

1. Zeylanicum perennis frutescens, M. 17. R. 3. L. 1.

OMPHALOIDES, Eng. *Navel-wort*.

P. 1/2. ♂ †

a.

1. Pumila verna symphiti folio, M. 3. *Cynoglossum*, R. 4. L. 6.OENANTHE, Eng. *Drop-wort*.

P. 2. ♂ †

a.

1. Flosculus radiantibus umbellarum proliferis, R. 4. L. 3.

OENOTHERA, Eng. *tree Primrose*.

P. 1/2. ♂ †

a.

1. Humillima fl. aureo.

OLEA, Fr. *Olivier*, Eng. *Olive*.

A. 4. ♂

c.

1. Sativa, M. 1. L. 1.

2. Fol. duro subtus incanis, R. 1. M. 2.

3. . . . buxi Crasso atro viridis lucido, R. 2. L. 1. β. M. 3.

4. . . . longo lato, B. 4.

5. . . . angusto, B. 5.

ONONIS, Fr. *Arrete beuf*, Eng. *Rest harrow*.

P. 3. ♂

a.

1. Spinosa fl. purpureo, R. 1. L. 1. *anonis*, M. 1.2. Spinis Carens Candidis floribus, *anonis*, B. 3. M. 4.

3. Fru

Catalogue des Arbres & Plantes Etrangères.

83

Habitus Culture

- F. ♂ + a. 3. Frutescens fl. rubro amplo, R. 7. L. 11. *an-*
nis, B. 8.
- P. 2. ♂ + b. 4. Lutea ad florum petiolos Capreolata, L. 7.
γ. M. 16.
- F. c. 5. Afr. fruticoso fl. purpureo *Pforalea*, L. 1.
- F. ♀ + d. 6. pumila fruticoso fl. pulchro purp. glo-
bofo *Pforalea*, L. 1.

OPHIOGLOSSUM, Fr. *Langue de serpent*,
Eng. *Adders tongue*.

- R. $\frac{1}{2}$. ♂ a. 1. Fol. ovato spica disticha, L. 1.

OPHRIS, Fr. *Double feuille*, Eng. *Tway blade*.

- R. $\frac{1}{2}$. ♂ a. 1. Bifolia, R. 1. L. 5. M. 1.

OPULUS, Fr. *Obier*, Eng. *Gelder-rose*.

- A. 4. II + 1. { 1. Frutescens fl. simplici, M. 1. R. 1. *viburnum*,
L. 7. α.
2. globoso, M. 2. *viburnum*, L.
7. β.
3. fol. varieg. M. 3.

OPUNTIA, Fr. *Raquette*, Eng. *Indian fig*.

- F. ♀ + e.f. 1. *Curasavica minima*, M. 9. cactus, R. 13.
L. 19.
- F. ♀ + e.f. 2. Flagelli formi angustissimo & longissimo folio
spinossimo, B. 9 M. 7.
- F. ♀ + d.f. { 3. Maxima fol spinoso latiss. & longissimo, M.
6 B 1. *Cactus*, R 14 L 17.
4. Eadem omnium maximum.
5. Fol. longissimo subinermibus *Cactus*, L. 18.
6. Latefolio spinis albis numerosis, M. 3. *Cac-*
tus, L 16.
- P. 1. ♀ + c. 7. Fol. minore rotundiore & Compressiore,
M 4.
- P. $\frac{1}{2}$. d. 8. Omnium minimum, M. 2.

OR-

Habitus

Culture

ORCHIS, Eng. *Satyrion*, or *fool-stones*.

B. I. II + b.

1. Testicula, fl. fucum Referens, M. 13.

B. I. II + a.

2. Palmatis fol. maculato fl. ex roseo varieg.

3. . . . angusto non maculato fl. purpureo

4. . . . Maculato fl. rubro varieg.

B. $\frac{1}{2}$. II + a.

5. Testiculata, fl. purpureo.

6. . . . albo.

7. . . . viridi Labiato.

8. . . . rubro Capitato.

B. I. II + a.

9. Palmatis fol. lato non maculato fl. purp.

10. . . . angusti fol. non maculato fl. roseo.

11. . . . maculato fl. purp. varieg.

ORNITHOGALUM, Eng. *Star of bethlehem*.B. $\frac{1}{2}$.

c.

1. Fol. Cordato ovatis, R. 1. L. 11. 1

2. Latifolium maximum, B 3. L. 6.

3. Exoticum magno fl. minori innato, B. 11.

B. 3. II

b.

4. Angusti fol. fl. ex albo virescente, B 4. M. 1. L. 5.

5. Spicatum fl. viridi lactescente, B. 5.

B. 2. 6 + d.*

6. Afr. fl. albo amplissimo.

B. $\frac{1}{2}$. II + b.

7. Humilis fl. Cæruleo odorato, M. 14.

B. 2. II a.

8. Neapolitanis, M. 7.

OROBUS, Fr. *Orobe*, Eng. *Bitter vetch*.

P. 2. 6 + a.

1. Caule ramoso fl. purpurascens, R. 1. L. 7. M. 4.

P. 1. 7 + a.

2. Purpureis sylvaticus vernus, M. 1. B. 1.

P. 1. 7 + a.

3. Sylvaticus vernus fl. albicante, B. 8.

P. 1. 6 + a.

4. Latifolio repens fl. purpureo, B. 6. M. 5.

OSMUNDA, Fr. *Osmonde*, Eng. *Flowering fern*.

P. 3. 6 a.

1. Sive filix florida, R. 3. L. 13.

P. 1. 6 b.

2. Frondibus duabis decompositis, R. 2.

P. 1. 6 a.

3. . . . pinnatis, R. 4. L. 13. *polypodium sensibile*, B. 3.

OSTE

Habitus Culture

O S T E O S P E R M O S.

- F. 8 + d. 1. Africanum odor. spinosum & viscosum, R.
1. L. 2. M. 4.
- F. 8 + d. 2. viscosum non spinosum.
- F. 8 + c. 3. Fol. populi alba, R. 2. L. 3. M. 2.
- F. 8 c. 4. . . . lanceolato dentato, L. 4. M. 3.
- F. 8 c. 5. . . . palmatis, L & M. 1.

O P H O N N A, Eng. *African Ragwort*.

- F. 8 + d. 1. Fol. pinnatifidis fl. aureo, R. 3. L. 10.
M. 3.

O x y s, Eng. *Wood-serrel*.

- B. 1/2. 8 c.* 1. Bulbosa Ethiopica fl. ex albo purpurascens,
M. 6. oxalis, L. 5. R. 3.
- B. 1/2. 8 + c.* 2. . . . afr. fl. purp. amplo, oxalis, R &
L. 2.
- B. 1/2. 8 + c.* 3. luteo Copioso, B. D tab. 29.
- B. II + c.* 4. Elegantissimo pleno.

P A D U S, Eng. *Bird Cherry*.

- A. 3. II + 1. Glandula duabus basi foliorum subjectus, R.
1. M. 1. *Prunus*, L. 1. *Cerasus avium dicta*.
- A. 4. 2. Virgin. fol. deciduis lanceolatis, M. 3.

P A E O N I A, Fr. *Pivoine*.

- P. 2. II + 1. Flore pleno rubro majore, M. 4.
2. albo major, M. 6.
3. roseo major.
4. purpureo tenui fol. B. 12.
5. Fl. purpureo *Coral pæony vulgo*.
6. Fol. tenuissimo fl. rubro simplex.

P A L M A, Eng. *Date-tree*.

- P. f. 1. Japonica, polypodi fol. M. 9. *Cycas*, R &
L. 1. A. T. E. S.
- A. 4. 2. Humilis pedunculo spinoso, M. 2. *Chama-*
rops, R & L. 1.
- M 3. Zey-

Habitus

Culture

P.

f.

3 Zeylanica non spinosa, *Chamærops*, R. 2.

A. 3.

d.

4. *Dactylifera vera mas phœnix*, R & L. 1.5. *fœmina phœnix*, R & L. 1.PANCRETIUM, Eng. *Sea daffodil*.

B. 2. ♂† b.

1. Fol. ensiformi fl. albo odorato, M. 3. R. 2. L. 6.

B. 1. ♂† f. o. x.

2. Am. fol. latissimo, floribus niveis majoribus odoræ balsami peruvianis, M. 5.

PAPAVER, Fr. *Pavot*, Eng. *Poppy*.

P. 2. ♂ 2.

1. Erraticum flavo flore, M. 18. L. 7.

P. 2. ♂† a.

2. Orient. hirsutum fl. magno auranteo, L. 8. M. 9.

3. Eadem fl. maculis nigris notatæ.

PARKINSONIA.

F. f. o. x.

1. Aculeata, H. C. tab. 13. L. 1.

PARNASSIA, Eng. *Grass of parnassus*.

P. 1/2. II† a.

1. Fl. albo, L. 1. M. 1.

PARTHENIUM, Eng. *Bastard feverfew*.

F. b.

1. Peruvianum arboreum, M. 3. *iva*, L. 2.

P. 2. ♀† a.

2. Fol. ovatis crenatis fl. albo, *vel beleni folio*, M. 2. L. 2.PASSARINE, Eng. *Sparrow wort*.

E. ♀

1. Fol. linearibus, R. L. & M. 1.

PAULINIA.

F. m

1. Foliis pinnatis foliolis incis, R. 1. L. 7.

PAVIA, Eng. *Scarlet Horse Chestnut*.

A. 3. II† a.

1. Virginiana, R. 1. B. 1. M. 1. *æsculus*, L. 2.

PENTAPETES.

F. ♂†

1. Fol. hastato, L. 1. *blattaria Zeylanica fl. am*
Coccinea.

Habitus Culture

PENTAPHYLLOIDES, Eng. Cinquefoil.

F. ♂ + a. 1. Fruticosum, B. 4. potentilla, R. 1. M. 3.
L. 1.

PERESCIA, Eng. Gooseberry.

F. c. o. f. 1. Aculeata fl. albo, R & M. 1. Cactus, L. 21.

PERIPLOCA, Eng. Virginian silk.

V. m. + a. 1. Monspeliaca fol. acutioribus, B. 3. M. 1. Cy-
nanchum, R. 2.

PERVINCA, Fr. Pervence, Eng. Periwinkle.

P. 1. 8 1. Fol. ex aureo varieg. M. 6.
2. . . . arg. varieg. M. 7.
3. Fl. pleno saturate purpureo, M. 5.
P. 3. 8 a. 4. Latifolio fl. Cæruleo, M. 3. vinca, L. 2.

PERSICARIA, Fr. Persicaire, Eng. Arse smart.

P. 3. 8 a. 1. Virg. fl. albo, R. 3. polygonum, L. 5.

PETIVERIA, Eng. Guiney henweed.

F. ♂ c. 1. Solani folio, R. L. & M. 1.
2. . . . Eleg. varieg.

PEUCEDANUM, Eng. Hogs fenel.

P. 3. 8 a. 1. Fol. linearibus ramosis, R. 3. L. 2.

PHALANGIUM.

P. 1. 8 c. * 1. Foliis linearibus fl. albo
2. Afr. fol. linearibus Car } ad anthericum, L.
nosis fl. albicante

PHASEOLOIDES, Eng. Carolina kid'ney bean tree.

V. 2. + b. 1. Caroliniensis fruticosa glycine, M. 2. L. 3.

PHILADELPHUS, Eng. Mock' orange.

A. 4. 8 + a. 1. Fol. subdentatis, R & L. 1. syringa alba,
M. 1.

Habitus

Cultuure

PHILYREA, Fr. *Filaria*, Eng. *Mock privet*.

A. 4. 8

a.

1. Crasso latissimo atroviridis fol. quasi ilicis,
L. 2. M. 2.

A. 4. 8

b.

2. Fol. ovato Lanceolatis vix Crenatis, R &
L. 1. M. 1.

F. 8

b.

3. Latifolia Lævis, M. 1. L. 1. 8.
4. Folio alterni, M. 3.
5. Angusti fol. secunda, M. 6.
6. Olæa ephesiaca fol. M. 7.PHLOMUS, Eng. *Sage-tree*.

F. 6 +

b.

1. Fruticosa fol. salvia latiore, M. 3.
2. longiore, M. 2.
3. subrotundo brevior, M. 1. L. 1. 8.

P. 5. 6 +

a.

4. Narbonensis fl. purpurascens, M. 4. L. 7.

F. 6 +

b.

5. Fruticoso fl. purpureo, M. 10.
6. purpurascens, M. 11. L. 2.PHLOX, Eng. *Lychnidea*.

P. 2. 8 +

a.

1. Fol. lineari Lanceolatis fl. pulchro purp. R &
M. 1.

P. 2. 11 +

a.

2. ovato lanceolato Caule reclinato fl. ru-
bello, M. 3. L. 3.

P. 4. 12 +

a.

3. lanceolatis linearibus Caule Elatior fl.
purpureo, M. 4.

P. 2. 8 +

a.

4. lucidis acutis fl. rubro quasi umbellato,
M. 1.

P. 2. 12 +

a.

5. lanceolatis hirsutis fl. rubro.

PHYTOLACCA, Eng. *American Nightshade*.

R. 8. 8 +

a.

1. Americana majori fructu, R. L. & M. 1.

F. 8 +

c.

2. fructu minore, B. 2. Rivinia, R.
1. L. 1. 8.

F. 8 +

e.

3. Mexic. baccis sessilibus fl. albo, M. 2. L. 1. 8.
4. rubello, M. 2. L. 1. 8.

Catalogue des Arbres & Plantes Etrangères.

39

Habitus Culture

PIMPINELLA, Fr. Pimprenelle, Eng. Burnet.

Fig. 1. M. d. 1. Spinosa semper virens, B. 7. poterium, L. & R. 3.

P. 2. Ω + a. 2. Maxima Canadensis, B. 1. sanguisorba, R & L. 2. M. 3.

PINUS, Fr. Pin, Eng. Pine tree.

A. 2. a. 1. Sativus fol. quinis nucleo eduli, L. 4. Combra dicta.

A. 1. a. 2. Silvestris, L. 1. M. 2.

A. 3. c. 3. Hierosolymytana praelongis tenuiss. viridibus setis, M. 15. fol. binis.

A. 3. a. 4. Amer. longiss. & viridibus setis, M. 19. fol. binis.

A. 3. a. 5. Virg fol. binis brevioribus & Crassioribus setis, M. 18.

A. 3. a. 6. Fol. brevibus glaucis Conis parvis albentibus, M. 3.

A. 2. a. 7. Am. fol. praelongis Conis plurimis Confertim nascentibus, M. 4.

A. 2. a. 8. ex uno folliculo setis longis tenuibus triquetris, M. 5. Weymouth pin vulgo.

A. 2. a. 9. Sybyriensis.

A. 3. a. 10. Virg. foliis tenuioribus Conis echinato, M. 16.

A. 1. a. 11. tripillis plerumque ex uno folliculo setis strobilus majoribus, M. 17.

PIPER.

P. 1. f. o. x. 1. Fol. obverse ovatis Caule procumbente, L. 11.

F. Ω + f. o. x. 2. Frutescens fol. septinerviis oblongo acuminatis, L. 2. tab. 83. fig. 2. T. 2.

PISONIA, Eng. Fingrigo.

F. e. 1. Aculeata, L. 1.

PISTACHIA; Fr. Terebinte, Eng. Turpentine tree.

A. 4. e. 1. Indica theophrasti, M. 2. L. 3.

M 3

Pir.

Catalogue des Arbres & Plantes Etrangères.

Habitus

Cultuure

PITTONIA.

A. 4. m† e. 1. Racemosa fol. ovato Lanceolato, M. 7. *nefortia*, R. 4. L. 4.

PLANTAGO, Fr. *Plantain*.

P. 1. 3† a. 1. Tattarica spica longo roseo Coloræ.

PLUMBAGO, Eng. *Leadwort*.

F. e. 1. Zeylanica fl. lacteo, L. 2. R. 2.

POINCIANA, Fr. *Poincillade*, Eng. *Flower fence*.

1. Fol. duplicato pinnato fl. luteo, M. 1. R & L. 1.
2. Eadem fl. ex rubro luteo Eleg varieg. R & L. 1.

POLEMONIUM, Eng. *Greek valerian*.

1. Flore Cæruleo fol. varieg. M. 4.
2. albo, M. 2. L. 1.
3. Cæruleo, M & L. 1.

POLYANTHOS, Fr. & Eng. *Tubercuse*.

P. 3. m† e.* 1. Fl. umbellato Cæruleo, M. 3. *Crinum*, L. 4.

1. Floribus alternis simplici, M. 1. L. 1.
2. Eadem fol. ex aureis Eleg. striato. tuberosæ vulgo.
3. Floribus alternis fl pleno, M. 2.

POLIUM, Eng. *Poley mountain*.

P. 1. 3† a. 1. Pyrenaicum hederæ terrestri fol. R. 5. M. 5. *teucrium*, R. 5. 23.

2. Montan. album supinum Capitulis multis globosis, B. 8. *teucrium*, L. 25.
3. luteum serratis angustioribus incanis fol. B. 7. *teucrium*, L. 24.

Habitus Culture

POLYPODIUM, Fr. Polipode, Eng. Polipody.

- P. 2. ☿ e. o. 1. Amer. magis dissectis Caule & Costa villosis, L. 54.
 2. Fronde duplicato pinnato, R. 5. L. 38.
 3. . . . alternatim duplicato pinnato, R. 7.
 4. . . . duplicato dorso bulbiferi, R. 9. L. 43.
 P. 1. ♀ c. 5. . . . alternatim supra decomposito, R. 10. L. 58.
 6. . . . pinnatis foliolis lanceolatis, R. 11. L. 13.

POPULAGO, Eng. Marsh marigold.

- P. 1. ♂ + a. 1. Major, M. 1. Caltha, L. 1.
 2. Flore pleno, M. 3. Caltha, L. 1. 7.

PORULUS, Fr. Peuplier, Eng. Poplar.

- A. 4. ☿ a. 1. Recinosa, B. 5. R. & L. 4. *tacamabaca theophrasti*, *tacamabaca*, M.
 A. 1. ☿ a. 2. Alba fol. variegato, M. 5.
 A. 1. ☿ a. 3. Caroliniensis fol. ampliff. Caule Caniculato, L. 5. *balsamum odoratiss. fundentibus*, M. 6.

Portulacca

POTENTILLA, Fr. Pourpier, Eng. Purslane.

- F. e. o. f. 1. Fruticoso semper virens fl. rubicundo, L. 3. *anacampteros*, R. 1.
 2. Fol. ovatis petiolatis fl. muscoso Capsulx bifurea, R. 2.
 P. 1. 2. m + e. o. f. 3. Lanuginosa procumbens fl. dilutius rubento, L. 2. æ. R. 3.

POTENTILLA, Fr. Quinte feuille, Eng. Cinquefoil.

- P. 2. ♀ + a. 1. Rectum luteum, L. 18.
 2. . . . floribus subluteis, R. 6. L. 10.
 P. 1. 2. ♂ a. 3. Album majus alterum, R. 3. L. 16.

PRA SIUM, Eng. Hedge nettle.

- F. ♂ c. 1. Fol. ovatis fl. magno Candida tantilla purp. varie notato, R. L. & M. 2.

PRI-

PRIMULA VERIS, Fr. Prime vere, Eng. Prim
rose or polyanthus.

- P. $\frac{1}{2}$. 8 † b. { 1. Fl. pleno pallide luteo, M. 7.
2. roseo, M. 8.
3. coccineo.
4. luteo duplici umbellato, herba paralytis
P. $\frac{1}{2}$. 8 a. } vulgo.
5. umbellato flores foliisque.
P. $\frac{1}{2}$. 8 † b. 6. Fol. Cunei formibus, L. 4.

Et d'ailleurs un assortiment de plus que
100 Especes, extremement belles, peintes
en toutes sortes des Couleurs, dont on
trouve les noms, couleurs & prix dans
une Catalogue separate.

PRINOS, Eng. Winter berry.

- F. 6 a. 1. Fol. longitudineter serrato, L. 1. M. 1.

PRUNUS, Fr. Prunier, Eng. Plum.

- A. 4. II a. { 1. Virginiana.
2. Flore pleno fructu amplo suaviss. Carnæ Co-
loris.

PSEUDO-ACACIA.

- A. 2. 6 † a. 1. Vulgaris, B. 1. Robinia, L. 1.

PTELEA, Eng. Carolina schrul trefoil.

- F. 6 † a. 1. Virginiana fol. ternatis, L. 1.
F. III c. 2. Africana salicis fol. L. 2. dodonea, R. 1.

PULMONARIA, Fr. Pulmonaire, Eng. Lung wort.

- A. $\frac{1}{2}$. V a. 1. Alpina maculosa, B. 2. L. 2. x.

PULSATILLA, Fr. Coquelourde, Eng. Pasque flower.

- A. $\frac{1}{2}$. 8 b. 1. Fl. pendulo limbo reflexo, R. 2. anemone,
L. 6.

Habitus

Culture

PUNICA, Fr. Grenadier, Eng. Pom granate.

- | | | |
|---------------|---|---|
| | | 1. Fl. simplici, B. 1. M. 1. L. 1. æ. |
| A. 4. nx + c. | } | 2. . . pleno majore, B. 2. M. 4. L. 1. β. Calice Longo. |
| F. nx + d. | | 3. American. pumila, M. 5. fl. simplici. |
| | | 4. fructu maximo. |
| A. 4. nx + c. | } | 5. Fl. pleno majore sine Calice. |
| | | 6. Calice brevi. |
| | | 7. minore Calice Longo. |

PYROLA, Fr. Pyrole, Eng. Winter green.

- | | | |
|-----------------------|----|------------------------------|
| P. $\frac{1}{2}$. II | a. | 1. Pistillo declinato, L. 1. |
|-----------------------|----|------------------------------|

QUERCUS.

- | | | |
|-------|----|--|
| A. 2. | a. | 1. Fol. Eleg. varieg. M. 3. |
| A. 4. | a. | 2. Pumila virg. Castanea fol. M. 27. |
| | | 3. Fol. amplioribus aculeatis, M. 33. L. 9. æ. |
| | } | 4. Calice echinato glande majore, M. 5 L. 13. |
| | | 5. minore, M. 8. L. 14. |
| A. 2. | | 6. Pediculis longissimus, M. 16. L. 12. |
| | } | 7. Mariana glande parva Compressa. |
| | | 8. Hispanica |
| | | 9. Nigra virginiana, L. 8. |
| | | 10. Rubra virginiana. |
| A. 4. | a. | 11. Virg. salicis longiori folio, M. 26. L. 1. γ. |
| A. 3. | a. | 12. . . pubescentibus fol. Eleg. dissecto M 11. |
| A. 4. | a. | 13. Humilis gallis binis, ternis, aut pluribus simul junctis, M. 6. |
| A. 3. | a. | 14. Castanea fol. procera arbor virginiana, M. 24. L. 7. |
| A. 3. | a. | 15. Marylandica fol. trifido ad sassafras accedente, M. 29. L. 8. γ. |

RANDIA.

- | | | |
|-------|-------|--|
| F. nx | c. c. | 1. Fruticoso fol. subrotundo fl. albo, L. 1. |
|-------|-------|--|

RANUNCULUS, Fr. Renonculen, Eng. Crowfoot.

- | | | |
|-------------------------|----|---|
| P. $\frac{1}{2}$. II + | a. | 1. Fol. plantaginis, B. 66. R 4. L 7. |
| P. 2. 8 + | a. | 2. Hortensis erectis fl. luteo pleno, L. 28. β. M. 1. |

N

g. Fol.

Habitus

Cultuure

P. 1. II + a.

P. 2. II + a.

P. $\frac{1}{2}$. V + a.

P. 2. II a.

P. 1. II a.

P. $\frac{1}{2}$. II a.P. $\frac{1}{2}$. II a.

R. 1. V II b.

& 5 +

3. Fol. aconiti fl. albo pleno, L. 16. M. 4.

4. Bulbosis fl. pleno luteo, B. 14. M. 5.

5. Rutacei fol. fl. pleno luteo, B. 29.

6. Montanis latiss. fol. hirsuto.

7. Seminibus aculeatis, R. 14. L. 32.

8. Fol. integerrima lanceolatis fl. aurco amplo, L. 3. M. 18.

9. Graminea fol. repente, R. 2. L. 1. β .

10. Ranunculus asiaticus sive persicus. Dont on trouve chez nous une Collection de mille especes d'une beauté achevée en toute sortes des Couleurs. On en trouve annuellement les noms, couleurs & prix spécifiée dans le Catalogue des oignons.

RAPUNCULUS, Fr. Raiponte, Eng. Thorat Wort.

P. 1. 8 + d.

1. Valerianelloides Cæruleis umbellatis, B. trachelium, R & L. 1. M. 1.

RHABARBARUM, Eng. Monks rabarb.

P. 3. 5 a.

1. Fol. lobatis, Rheum, L. 2. Lapathum, B & M.

RHAMNUS, Fr. Nerprun, Eng. Buckthorn.

A. 3. 5 a.

1. Catharticus, B & M. 1. R. 7. L. 1.

F. 5 + b.

2. Aculeis geminatis, R. 1. L. 5. paliurus, porte Chapeau dicta.

A. 4. 5 c.

3. Afer. fol. pruni fl. Candicanto spinis foliosis, B. M. 6. Celastrus, R. 2. L. 4.

F. 12 c.

4. Seu jujuba amer. spinosa, R. 3. L. 11.

F. 5 c.

5. Inermis fol. ovatis integerrimus glabris, R. 6. L. 3. β .

F. c.

6. . . . africanis humilis fol. buxi brevior.

F. c.

7. Zeylanica spinosa fol. oblongo ferrato.

F. 8 + c.

8. Afer. spinosa fructu triloculari.

RHUS, Fr. Sumac, Eng. Sumach.

A. 4. 5 a.

1. Fol. pinnatis ferratis, B. R. & L. 1.

2. Fol.

Habitus	Cultuure	
A. 4. ☽	a.	2. Fol. pinnatis fructu thomboidea, R. 2. L. 4.
		3. . . ternatis glabris, R. 4. L. 6.
A. 4. ☽	b.	{ 4. . . minor Caule volubili, L. 6. γ.
A. 4. ☽ †	a.	5. . . pinnatis glabris panicula Eleg. cocci- neis, L. 3.
A. 4.	c.	6. Afr. trifoliat. minus glabrum splendente fol. R. 7 L. 11.
A. 4.	c.	7. . . trifoliatum majus glabrum, subrotundo medio quandoque Crenato, B. 12.
F. ☽	c.	{ 8. . . trifoliato angusto glabro. 9. . . glabro angustissimo.
A. 4.	c.	10. . . oblongo obtuso.
A. 3.	a.	11. Canadensis altiss. arbor vernicifera spuria vulgo.
		{ 12. Afr. trifol. integro subrotundo molli & inca- no, M. 8.
F.	c.	{ 13. . . majus pubescentibus fol. dentato, L. 8.
		{ 14. Javanica fol. pinnatis serratis, L. 2.

RIBES, Fr. Groselier, Eng. Curran tree.

		{ 1. Alpinum dulce, R. 3. L. 2. M. 6.
		2. Fructu rubro fol. Eleg. varieg. M. 2.
F. II	2.	{ 3. . . nigro fol. varieg. M. 13.
		{ 4. Virginiana nigro fl. oblongo, L. 3. 6. M. 14.

RICINUS, Fr. Ricin, Eng. Oil-seeds.

F. Ω	e.	1. Perennis, B. 4.
------	----	--------------------

ROSA, Fr. Rosier, Eng. Rose tree.

		{ 1. Carnæo fl. pleno, B. 17.
		2. Humillima fl. pleno parvo suave rubento,
		3. Pedunculo muscoso, B. 12. M. 16
F. ☽ †	a.	{ 4. Spinossimo pimpinella glabre fol. fl. pleno li- vide rubento.
		{ 5. Rubra pallidior fl. pleno, T.
		{ 6. Fl. pleno pallido amplissimo.

N 2

7. El.

F. 5+

F. 12+

F. 5+

F. 12

7. Fl. Carnæo pleno.
8. . . pallido suaviter Rubento pleno.
9. . . . rubello pleno spinis Carens.
10. . . pulchro purp. pleno per intervallæ flos ex flore.
11. Lutea multiplex, B. 4. M. 23.
12. Fl. pleno ex rubro roseo.
13. odore Cinnamomi, T. M. 20.
14. suave rubento.
15. ex purpureo rubello.
16. amplo purpureo.
17. albicante.
18. purpureo.
19. ex rubro purpureo.
22. . . plenissimo pallido.
21. . . pleno purpurascente.
22. Omnium Calendarum fl. pleno carnæo, T. M. 35.
23. Lutea simplex, B. 1. M. 22.
24. Fl. pleno quasi umbellato lividi rubello.
25. Prænestina fl. varieg. pleno, B. 24. M. 31.
26. Regina dicta per intervallæ flos ex floræ.
27. Anglicæ fl. pleno variegato, T. M. 32.
28. Muschata fl. albo pleno, B. 16.
29. Fl. pleno Carnæo in medio rubento, B. 8.
30. Pomifera major, T.
31. Fl. pleno ex rubro nigricante, T.
32. . . rubello pleno, B. 12.
33. Eglanteria spinosissimo fl. albo simplex.
34. Saturateis rubens T. fl. pleno kermosino.
35. Multiplex media T. pleno flore.
36. Fl. pleno amplo ruberrimo, B. 20.
37. Eglanteria fol. pimpinella glabro fl. rubro parvo pleno.
38. Semper virens, M. 34.
39. Fl. pleno saturatus purpureis.
40. . . . rubens altera.
41. . . . albo, T. B. 10.
42. Vix spinosa fructu globoso.
43. Virg. vel schotica fl. ex purpureo & rubro Eleg. maculato, M. 6.
44. Virgin. autumnales flore rubro simplex odore suavissimo.

45. Fl.

Catalogue des Arbres & Plantes Etrangères.

95

Habitus

Cultuure

- F. 5 + a. { 45. Fl. atro purpureo duplex, M. 18.
46. Silvestris fol. odoratis, M. 7.
47. fl. pleno, M. 9.
48. Simplex fl. nutante, L. 11.
49. intus Coccineis extus luteis.
50. Provincialis fl. rubro pleno, M. 17.
51. Fl. pleno suaviter rubello.
52. plenissimo purpurascens.
53. incarnato, M. 30.
54. Sine spinis fl. minore, M. 37.

ROSMARINUS, Fr. *Romarin.*

- F. II b. { 1. Fol. ex albo Eleg. varieg. B. 4. M. 6.
2. . . . aureis striatis, B. 2. M. 3.

ROYENA, Eng. *African bladder nut.*

- A. 4. γ c. { 1. Fol. singulari lucido, L. R. & M. 1.
2. . . . lanceolatis sive myrti angusti fol. L. R.
F. γ c. { & M. 2.
3. hirsutis, L. R. & M. 3.

RUBIA, Fr. *Garance*, Eng. *Dyers madder.*

- P. 2. II + a. { 1. Folio quaternis glabrus, R. 4.
P. 4. II a. { 2. Tinctorum sativa, M. 1. L. 1. β.

RUBUS, Fr. *Ronce*, Eng. *Bramble.*

- F. 6 + a. { 1. Odoratus dictus fl. Eleg. purpureo, M. 10.
R. 1. L. 7.
V. Ω + a. { 2. Fl. albo pleno, B. 6. M. 15.
V. Ω a. { 3. Major fol. variegato, M. 4.

RUDEEKKIA, Eng. *Dwarf sun flower.*

- P. 2. 6 + b. { 1. Integri fol radio aureo umbone atro ruben-
to, L. 3. M. 1.
P. 3. Ω m b. { 2. Fol. oppositis lanceolatis petalis radii bifidis,
L. 5. M. 6.
P. 8. Ω m a. { 3. Fol Compositis lancineatis fl. aureo, L. 1. M. 3.
4. lacin. angustioribus fl. luteo,
M. 4.

N 3

RUEL-

R U E L L I A.

- | | | |
|----------|----|----------------------------|
| P. 1. ♂† | c. | 1. Americana fl. Cæruleo. |
| P. 1. ♀ | c. | 2. Pedunculus multifloris. |
| F. ♂ | c. | 3. Fruticoso. |

R U S C U S.

- | | | |
|-----------------------|----|--|
| P. 1. II | a. | 1. Myrti fol. aculeato, R. L. & M. 1. |
| P. $\frac{1}{2}$. II | b. | 2. Latifolio fructu fol. insidente, L. 2. |
| P. $\frac{1}{2}$. II | b. | 3. Angusti fol. fructi fol. inascente, L. 3. |
| P. 2. II | b. | 4. Racemoso, L. 5. |

R U T A, Fr. *Ruë*, Eng. *Rue*.

- | | | | |
|-------|----|---|---|
| F. ♂† | c. | { | 1. Chalapensis latifolius florum petalis villis scatentibus, M. 4. B. 5. L. 1. ♂. |
| | | | 2. tenui fol. fl. petalis villis scatentibus, M. 5. B. 4. L. 1. ♀. |
| F. ♂ | a. | | 3. Hortensis minor fol. ex albo varieg. M. 3. |

S A B I N A, Eng. *Savine*.

- | | | | |
|----|----|---|--|
| F. | a. | { | 1. Tamarisci fol. M. 1. <i>Juniperis</i> , L. 6. |
| | | | 2. Fol. Eleg. variegatis, M. 3. |

S A L I C O R N I A, Eng. *Glasswort*, or *saltwort*.

- | | | |
|----|----|---|
| F. | d. | 1. Arabica articulis obtusis, L. 2. |
| F. | a. | 2. Geniculata semper virens, L. 1. ♀. M. 1. |

S A L I X, Fr. *Saule*, Eng. *Willow*.

- | | | |
|----------|----|---|
| A. 3. ♂† | a. | 1. Fol. laurinis, utrumque virente odorato, R. 2. M. 3. |
| A. 4. ♂ | a. | 2. Elegantiss. varieg. M. 9. |
| A. 3. ♂ | a. | 3. Babylonica ramis pendulis, M. 11. L. 9. R. 10. |
| F. ♂ | a. | 4. Fol. buxi majore fl. purpureo. |

S A L V I A, Fr. *Sauge*, Eng. *Sage*.

- | | | |
|---------|----|---|
| F. ♂ | c. | 1. Fol. hastata triangularo, R. 3. L. 20. |
| P. 3. ♀ | a. | 2. Cordatis fl. luteo, R. 4. L. 19. |

3. Mex-

Habitus	Cultuure	
F. \rightarrow	d.	3. Mexicana altiss. facie heliotropi, R. 5. L. 15.
F. Ω	d.	4. Afr. fol. schorodonea fl. violaceo, R. 6. L. 21.
F. Ω +	d.	5. amplo infastigium Convolutæ.
F. \odot	c.	6. . . frutescens fl. magno aureo, R. 7. L. 22.
P. 2. \odot	b.	7. Fol. dentato pinnato asperis, L. 26.
F. δ +	d.	8. . . Cordato sagittatis dentatis, R. 10. L. 18.
F. \mathfrak{B}	b.	9. Major hispanica fl. albo, B. 2. 10. Tricolor variegato, B. 3. M. 4. 11. Latifol. fl. ex luteis varieg. B. 4. 12. . . . magis undulatis, B. 17. L. 5.
P. 1. Ω	a.	13. Fol. serrates sinuatis, R. 17. L. 13.
F. \mathfrak{S}	b.	14. Arborea trilobatis & quinque Lobatis quas pinnatis fl. Cæruleo. 15. Fol. linearibus lanceolatis, L. 1. 16. Arborea fol. Compositis pinnatis. 17. Major fol. ex albo varieg. M. 3. 18. Angustiss. fol. Linea aureo striato. 19. Officinarum, L. 4.

SAMBUCUS, Fr. *Sureau*, Eng. *Elder tree*.

A. 4. γ	a.	1. Racemosa Rubra, R. 2. M. 4. L. 4.
A. 4. γ +	a.	2. Fol. Eleganter varieg. M. 6. B. 6.
P. 8. δ +	a.	3. Apii folio, M. 5. L. 3. 7.
		4. Fructu ex viridi albo, M. 3.
		5. Humilus vel Ebulis, L. 1. M. 7.

SANGUINARIA, Eng. *Puccoon*.

P. $\frac{1}{2}$. γ	b.	1. Minor fl. simplici, M. 1. L. 1. 2.
-----------------------------	----	---------------------------------------

SANTOLINA, Fr. *Garderohe*, Eng. *Lavender Cotton*.

F. \mathfrak{S} +	b.	1. Fol. villosis incanis fl. aureo majore, B. 2. 2. . . teretibus quadrifariam dentatis, L. 1. fl. aureo. 3. . . obscure virente fl. aureo, B. 3. 4. sulphureo. 5. . . minus incanis fl. aureo, B. 4. 6. sulphureo.
---------------------	----	---

7. HH

Habit

Culture

- | | | |
|-----------|---|---|
| F. 6 + b. | { | 7. Hispanica fol. vermiculato fl. aureo, B. 11. |
| | | 8. Tomentoso fol. oblongis, R. 6. <i>filago</i> , L. 2. |
| | | 9. Agerati fol. B. 8. <i>Chrysanthemum</i> , R. 7. L. 14. |
| | | 10. Caule Cinereis fol. viridis quadrifariam dentatis. |

SAPINDUS, Eng. *Soapberry*.

- | | | |
|----|----------|---|
| F. | f. o. x. | 1. Fol. Costæ alata inascentibus, L & M. 1. |
|----|----------|---|

SAPONARIA, Eng. *Soap-wort*.

- | | | |
|-----------|----|--|
| P. 3. 6 | a. | 1. Fl. pleno, R. 1. <i>Lychnis</i> , B. 36. |
| P. 1/2. 6 | a. | 2. Caulibus dichotomis procumbentibus, L. 3. R. 6. |

SATUREJA, Fr. *Sarriete*, Eng. *Savory*.

- | | | |
|-----------|----|---|
| P. 1. 1 + | a. | 1. Fl. in pediculis ramosis, R. 2. L. 6. |
| P. 1. 6 | a. | 2. Cretica fol. rigidis brevi Crasso, R. 4. L. 3. |
| P. 1/2. 6 | b. | 3. Spicata, L. 2. R. 3. |
| P. 1. 6 | a. | 4. Montana, M. 2. |

SAURURUS, Eng. *Lizards-tail*.

- | | | |
|------------|----------|--|
| P. 1. 12 + | e. o. x. | 1. Fol. profundo Cordatis, R. 2. L. 1. |
|------------|----------|--|

SAXIFRAGA.

- | | | |
|------------|----|---|
| P. 1. 11 + | a. | 1. Fl. albo pleno, B. 2. M. 2. |
| P. 1/2. 11 | a. | 2. Procumbens fol. linearib. integris & trifidis, R. 6. L. 30. x. |
| | | 3. . . . trifidis & quinquifidis, R. 7. L. 30. 3. |
| P. 2. 6 + | a. | 4. Sedi folio multiflora, B. 7. L. 1. 7. |
| | | 5. . . . angustiore serrato, R. 1. L. 1. e. |
| P. 1. 6 + | a. | 6. . . . subrotundis serratis, B. 9. L. 1. 3. |
| | | 7. Pistillo fl. pallido, L. 12. |
| | | 8. . . . rubro, L. 12. |
| | | 9. Fol. Cordato ovalibus Crenatis Corollis albis, L. 10. |

SCHAE

Habitus

Culture

SCHABIOSA, Fr. *Schabieuse*, Eng. *Scabious*.

- F. ♂ + c. 1. Afr. frutescens fl. roseo, R. 7. M. 10. L. 14. æ.
- F. ♂ + c. 2. fol. lanceolatis integris, R. 8. L. 15. æ.
- F. ♂ + c. 3. rigido ferrato splendente fl. albo, L. 3. β.
- F. ♂ + b. 4. linearibus fl. roseo, L. 13.
- P. 2. Ω + a. 5. Fl. globoso niveo, L. 10. β.
- P. 3. Ω a. 6. rubro, L. 10. β.
- F. ♂ + c. 7. albo maxima, L. 10. æ.
- F. ♂ + c. 8. Afr. frutescens floribus ad Cæruleam inclinantibus, M. 14.

SCHILLA, Eng. *Squill*.

- B. 2. η c.* 1. Radice rubra, R. 1. M. 1. L. 1. æ.

SCHLAREA, Fr. *Toute bonne*, Eng. *Clary*.

- P. 3. Ω a. 1. Lanuginosa ampliff. fol. M. 2.
- P. 3. Ω + a. 2. Orient. betonica fol. spica longissima purpureis.

SCHROPHULARIA, Fr. *Scrofulaire*, Eng. *Figwort*.

- P. 3. Ω + b. 1. Hispanic. sambuci fol. glabra, R. 4. M. 3. L. 8. æ. fl. rubro luteo vario pulchro.
- P. 2. ♂ + b. 2. Fol. pinnatis ruta Canina dicta, R. 5. L. 9. M. 5.
- P. 2. Ω b. 3. Laserpitii massiliensis folio, M. 6.
- P. 2. Ω a. 4. Orient. foliis Cannabinis, M. 18. L. 6.

SCUTELLARIA, Fr. *Latoque*, Eng. *Sculleap*.

- P. 1. 2. Ω + c. 1. Fol. pinnatis fl. luteo, R. 1. L. 1. æ.
- P. 1. 2. Ω + b. 2. Alpina supina fl. magno Cæruleo, R. 3.
- P. 1. ♂ c. 3. Fol. Cordato fl. albo, R. 5. L. 12.
- P. 2. Ω + a. 4. oblongo fl. purp. R. 6. L. 11.
- P. 1. Ω a. 5. lanceolato dentato fl. albo, B. 5. L. 4.
6. Cæruleo, R. 2. L. 4.

O

SE-

SEDUM, Fr. Joubarbe, Eng. Housleek.

F. $\text{nx} \times +$ d.f.1. Majus arborescens, M. 10. *semper vivum*, R. 1. L. 1.

F. d.f.

2. Eadem fol. ex albo varieg. M. 11.
3. pallide luteo varieg.P. 2. nx d.f.4. Canarinum omnium maximum, M. 12. *semper vivum*, R & L. 2.P. $\frac{1}{2}$. $\text{S} +$ a.5. Montanum tomentosum, M. 2. *semper vivum*, L & R. 5.P. $\frac{1}{2}$. a.

6. Crispum & monstrosum, M. 19. B. 14.

P. $\frac{1}{2}$. $\text{S} +$ a.7. Alpinum minus fl. Eleg. rubro, M. 24. *semper vivum*, L. 6.8. Globulis decedentibus, M. 8. *semper vivum*, L & R. 4.P. $\frac{1}{2}$. $\text{S} +$ a.9. Minus luteo fol. acuto, R. 4. L. 9. β .10. Cæpæum dictum, R. 3. L. 7. *perenni*.

11. Minus tereti fol. album, R. 6. L. 10.

12. Parvum acre fl. luteo, R. 45. L. 9. α .

SENECIO, Fr. Senecion, Eng. Groundsel.

F. $\Omega +$ o.1. Afr. fol. retuso, B. 5. *Solidago*, R. 6.R. 2. $\delta +$ e o. α .2. Jacobea fol. radice lignosa, *China officinarum dictus*, R. 8. L. 3.

SERRATULA, Eng. Saw-wort.

P. 2. S a.1. Fl. purpureo, R. 1. M. 1. L. 1. α .
2. Candido, M. 2. L. 1. α .P. 2. $\text{S} +$ b.

3. Angusto plantaginis fol. fl. Eleg. purp. M. 4.

SESELI, Eng. Wild-spignel.

P. S a.

1. Ferula facie tenui fol. B. 3. M. 3.

SIDERITIS, Fr. Crapaudine, Eng. Iron wort.

F. S d.1. Fruticosa fol. lanceolatis linearibus, L. 3. β .

SILENE.

F. S b.

1. Fruticosa myrti fol. fl. rubro, R. 7. L. 9.

SIL

Habitus

Culture

S I L P H I U M.

- P. 4. m. a. 1. Fol. ternatis, R. 2. L. 5.

S I S Y R I N C H I U M.

- | | | | | | |
|-------|----------|---|-----|------|-------------------------------------|
| B. 1. | Ω | † | d.* | 1. | Afric. iridis fol fl. spicato albo. |
| B. 2. | Ω | † | d.* | { 2. | Cæruleo. |
| | | | | 3. | purpureo virescente |
| | | | | | maculis atro purpureis. |
| B. 3. | Ω | | d.* | 4. | . . maximo fl. parvo lilaci Colore, |

SMILAX, Eng. Bindweed.

- F. b.
- | | | | | |
|--|----|------------------------------|--------------|-------|
| | 1. | Aspera fol. Cordato oblongo, | R. 2. | L. 1. |
| | 2. | | acuto, R. 2. | L. 1. |
| | 3. | | amplissimo, | L. 8. |

SMYRNIUM, Fr. *Maceron*, Eng. *Alexanders*.

- P. 4. Ω 2. 1. Caulibus ternatis petiolatis, R. 2. L. 2.

SOLANUM, Fr. *Morelle*, Eng. *Nightshade*.

- | | | |
|--------|-------|--|
| F. ♂ | e. o. | 1. Amer. frutesc. spiniferum spinis igneis, M. 9. L. 22. |
| F. ♂ + | d. | 2. Pomifer. fol. profundo lacineato, R. 8. L. 19. M. 12. |
| F. ♂ + | d. | 3. tomentoso incano Caule solo spinoso, R. 12. L. 21. |
| F. ♀ + | e. | 4. Lignosum fl. Cæruleo amplo lauri folio, R. 7. L. 2. |
| F. | d. | 5. Afr. schandens hederæ folio. |
| F. ♂ + | b. | 6. Schandens fol. ex albo varieg. M. 6. |
| F. ♂ + | b. | 7. latifolio ex aureo varieg. |
| F. ♀ | e. | 8. Lignosum fol. laurini Caule atro viridi fl. albo. |
| F. ♂ | c. | 9. Frutescens fol. retuso fructu Cerasino, R. 6. L. 3. |
| F. ♂ + | e. | 10. Amer. fol. querci effigui fl. Cæruleo, L. 6. |
| F. ♀ + | e. | 11. Inermis fol. oblongo ovato sinuatis utriusque glabris floribus alaribus. |

102 *Catalogue des Arbres & Plantes Etrangères.*

Haibtus Culture

F. Ω c. 12. Spinosum fol. querci effigui, *schinfebunda* dicta.

F. Ω e. 13. Indicum fruticosum *schinfebunda* dicta.

SOLDONELLA, Fr. *Soldanele*.

P. $\frac{1}{2}$. γ † a. 1. Alpina, L. R. & M. 1.

SORBUS, Fr. *Sorbier*, Eng. *Service*.

F. II b. 1. Virginiana arbuti fol. Mespilus, L. 3. R. 3.

2. Sativa fr. magno ovato medio rubento, M. 4.

A. 4. II † a. { 3. mali formi utriusque Compresso & rubento.

4. Aucuparia, M. 10. R & L. 1.

SPARTIUM, Eng. *Broom*.

F. Ω a. 1. Fl. luteo, R. 2. L. 3.

SPIRÆA.

A. 4. Ω † a. 1. Opuli fol. R. 2. M. 2. L. 6.

F. II † a. 2. Hyperici fol. R. 3. L. 3. M. 3.

F. δ † a. 3. Salice fol. fl. roseo, R. L. & M. 1.

F. δ † a. 4. albo spica amplissimo.

F. Ω † a. 5. Hyperici fol. Crenato fl. albo, L. 5. M. 4.

F. Ω † a. 6. Virg. fol. lanceolatis obtusus Crenato fl. rubro spicato amplo.

STACHYS, Eng. *Base horehound*.

F. Ω c. 1. Canariensis fruticosi verbasci fol. M & R. 5.

STAPHYLADENDRON, Fr. *Nex Coupez*,
Eng. *Bladder nut*.

A. 4. Ω a. { 1. Foliis pinnatis, B & M. 1. *staphylæa*, R & L. 1.

2. Virginiana, B & M. 1. *staphylæa*, R & L. 2.

STYRAX, Fr. & Eng. *Storax*.

A. 4. c. 1. Fol. mali Cotonei, R. L. & M. 1.

STRU-

Habitus Culture

STRUTHIA.

F. ♂† d. 1. Fol. linearibus, L. syst. Nat.

SUBER, Fr. *Liege*, Eng. *Cork tree*.

A. 4. b. { 1. Latifolium perpetua virens, B & M. 1. *quercus*, R. 5. L. 4.
2. Angusti folium, M. 2.

SYMPHITUM, Fr. *Consoude*, Eng. *Comfrey*.

P. 2. ♂ a. 1. Fl. purpureo fol. ex aureis variegato.

TABERNAMONTANA.

F. c. 1. Foliis alternis, L. 3.

TAMARINDUS, Fr. *Tamarin*.

A. 4. g. o. x. 1. Officinarum, R & L.

TAMARISCUS, Fr. *Tamaris*, Eng. *Tamarisk*.

F. ♀† a. { 1. Narbonensis, M. 1. L. 1.
2. Germanicus, M. 2. L. 2.

TAMUS, Eng. *Black bryony*.

R. V. ♀ c. 1. Fol. Cordato, L & R. 1.

TANACETUM, Fr. *Tanésie*, Eng. *Tansy*.

F. ♂ d. { 1. Afr. arbor. major, R. 2. M. 5. L. 3.
2. . . frutesc. minor, R. 4. M. 8. L. 2.
P. 2. Ω a. 3. Vulgare foliis Crispus, L. 7. β.

TARCHONANTOS.

A. 4. ♀ c. { 1. Fol. salvia odoræ rosmarini fl. purpureo violaceo, L. 1. M. 1.
2. Fol. latioribus & undulatis.

TAXUS, Fr. *If*, Eng. *Yew-tree*.

F. γ a. 1. Fol. variegatis, M. 3.

TETRAGONOCARPOS.

- | | | | |
|----------------------|----|---|--|
| F. ♂ | d. | { | 1. Fol. longo & angusto, M 1. <i>tetragonia</i> , L. 1.
R. 1. |
| | | | 2. Afr. fol. longo lato, M. 2. |
| P. $\frac{1}{2}$. ♂ | d. | | 3. Fol. portulacæ radice Crassa, M 3. <i>tetragonia</i> ,
L & R. 2. |

TEUCRIUM, Eng. *Tree germander*.

- | | | | |
|----------------------|----|---|---|
| F. ♂ + | c. | { | 1. Baticum fl. violaceo, R. 1. L. 9. |
| | | | 2. fol. variegata, M. 3. |
| F. ♀ + | b. | { | 3. Fl. pallide lutescente, R. 15. L. 20 æ. |
| | | | 4. . . . purpureo parvo folio, L. 20. β. |
| P. $\frac{1}{2}$. ♀ | b. | | 5. Fol. ovatis utriusque acutis fl. Cæruleo, L.
13. R. 16. |
| P. 1. ♀ + | a. | | 6. Virg. fol. oblongo ferrato spica amplissima
rubro. |
| P. $\frac{1}{2}$. ♀ | a. | | 7. Fol. ovatis inciso Crenatis fl. albo, R. 17.
L. 19. æ. |

THALICTRUM, Eng. *Meadow rue*.

- | | | | |
|----------------------|----|---|--|
| P. $\frac{1}{2}$. ♂ | a. | | 1. Minimum mont. atrorubens, R. 5. L. 1. |
| P. 1. II + | a. | | 2. Minus radice grumoso, fl. albo majoribus
R. 7. L. 3. |
| P. $\frac{1}{2}$. ♂ | a. | | 3. Minimum fætidissimum, R. 4. L. 2. |
| P. 3. ♂ + | a. | { | 4. Aquilegiæ fol. staminibus albis, B. 1. M. 3. |
| | | | 5. purp. R. 1. L. 12. |
| P. 4. ♂ | a. | { | 6. Prætenfis angustifolio, B. 9. M. 13. |
| | | | 7. angustissimo fol. R. 3. L. 9. |
| P. 5. ♂ + | a. | | 8. Majus staminibus luteo, glauco fol. L. 4.
R. 6. |

THEOBROMA, Fr. *Cacao*.

- | | | |
|----|-------|---|
| F. | f. o. | 1. Fol. ferratis, L. 2. <i>guazuama ulmifolia</i> . |
|----|-------|---|

THUYA, Fr. *Arbre de vie*, Eng. *Tree of life*.

- | | | |
|---------|----|--|
| A. 4. γ | a. | 1. Vulgaris theophrasti, R. L. & M. 1. |
|---------|----|--|

2. Chī-

Habitus	Culture
<p>1. <i>Adaptation to environment</i></p> <p>2. <i>Development of character</i></p> <p>3. <i>Formation of habits</i></p> <p>4. <i>Acquisition of knowledge</i></p> <p>5. <i>Development of skills</i></p> <p>6. <i>Formation of values</i></p> <p>7. <i>Development of personality</i></p> <p>8. <i>Formation of social norms</i></p> <p>9. <i>Development of moral principles</i></p> <p>10. <i>Formation of ethical standards</i></p>	<p>1. <i>Acquisition of knowledge</i></p> <p>2. <i>Development of skills</i></p> <p>3. <i>Formation of values</i></p> <p>4. <i>Development of personality</i></p> <p>5. <i>Formation of social norms</i></p> <p>6. <i>Development of moral principles</i></p> <p>7. <i>Formation of ethical standards</i></p> <p>8. <i>Acquisition of knowledge</i></p> <p>9. <i>Development of skills</i></p> <p>10. <i>Formation of values</i></p>

- A. 4. γ a. { 2. *Chinensis* fructu Cæruleo subrotundo, L &
R. 2. M. 3.
3. *Theophrasti* fol. varieg. M. 2.

THYMUS, Fr. *Thim.*

- P. $\frac{1}{2}$. II a. { 1. Odoratus fl. albo, *serpillum*, M. 8.
2. Fol. variegato, *serpillum*, M. 9.
3. Hirsutissimum, *serpillum*, M. 6.

TINUS, vel laurus tinus, Fr. Laurier sin.

- A. 4. ♂ † b.
- Viburnum, L. 1.
1. Primus Clusii fol. atro viridi splendoro am-
plo flore, M. 4.
 2. Eadem fol. varieg. M. 6.
 3. Secundus Clusii fol. sua hirsutis fl. extus ro-
seis, M. 2.
 4. Tertius Clusii fol. minoribus, M. 3.
 5. Virgin. fol. oblongo ovato, M. 7. *Viburnum*
L. 4.
- A. 4. a.

TRAGACANTHA. Fr. Barberenard, Eng. Goatsthorn.

- F. II b. i. Fol. non deciduis fl. albo, R. i.

TRIFOLIUM.

- | | | | |
|-----------|----|---|---|
| F. ♂ + | d. | } | 1. Afr. fruticans fl. purpurascente, R. 5. <i>psoralea</i> , L. 4. 6. |
| | | | 2. Eadem fl. pallescente <i>psoralea</i> , L. 4. 8. |
| P. 2. Ω + | a. | | 3. Mont. spica longiss. rubente, R. 18. L. 17. |
| E. ♂ + | d. | | 4. Afr. frutic. fl. Eleg. Cæruleo, <i>psoralea</i> , L. 4. 8. |
| P. 1. Ω + | a. | | 5. Mont. spadiceum suevicum. |

TRICHOMANUS, Fr. *Politric*, Eng. *Maidenhair*.

- P. $\frac{1}{2}$. II 2. I. Fol. pinnatis.

TRIUMPHETTA.

- F. ny^+ f. e. x. i. Fol. subrotundo dentato, R & L. i.

TUR-

TURNERA.

F. 8 + f. o. x. 1. Petiolatis floriferis, R & L. 1. H. C. tab 10.

TUSSILAGO, Fr. *Pas d'ane*, Eng. *Colts foot*.

P. 1/2. 8 + b. 1. Alpina rotundi fol. glabro fl. purp. R. 2.
 L. 2. æ.

TULIPA, Fr. *Tulipe*, Eng. *Tulip*.

- | | |
|---------------------|--|
| B. 1. 8 a. | 1. Præcox luteo, L. 1. |
| B. 1/2. 8 1/2. + a. | 2. Fl. Coccineo puniceove rutilante, T. L. 3. |
| B. 1/2. & 1. a. | 3. Printanieres. Dont on trouve chez nous une Collection nombreuse dans toute fortes des Couleurs. |
| 8 + | |
| B. 1. & 1 1/2. a. | 4. Fl. pleno. Des quelles on peut avoir un assortiment de 50 Especies differentes. |
| II + | |
| B. 2. & 2 1/2. a. | 5. Tardives. Dont on trouve ci apres un denombrement des plus beaux Especies qui sont Connue Jusq'ici en Europe tant des Bisarrées, Baguettes, Rigaux & d'autres Especies le plus Curieux. |
| II + | |

ULEX, Fr. *Genet epineux*, Eng. *Furze or Whins*.

F. 8 + a. 1. Fl. luteo, L. 1. M. 1.
 F. 6 + e. 2. . . rubro, L. 2. M. 2. *kaapse bassagnaay boom*.

ULMUS, Fr. *Orme*, Eng. *Elm tree*.

A. 3. v a. 1. Fol. Eleganter varieg.

URENA, Eng. *Indian Mallow*.

F. 2 f. { 1. Fol. angulatis, L. 1.
 2. . . sinuatis multifidis villosis, L. 2.

URTICA, Fr. *Ortie*, Eng. *Nettle*.

F. c. 1. Chinensis fol. subtus argenteis, L. 12. M. 9.

VALERIANA.

P. 1. 8 + a. 1. Fol. infimis integris proximis lacineatis, R.
 1. L. 6.

P. 3. II + a. 2. . . omnibus pinnatis, R. 2. L. 5.

3. Fol.

Habitus Culture

- P. 2. ♂ + a. { 3. Fol. lanceolatis fl. rubro, R. 7. L. 3.
4. albo, R. 7. L. 3.

VERATRUM, Eng. *White hellebore*.

- P. 3. ♂ a. 1. Fl. atro rubento, L. 2.

VERBASCUM, Fr. *Boillon blanc*, Eng. *Mullein*.

- P. 3. ♂ + a. { 1. Perennis nigrum fl. albo, T.
2. luteo, T.

VERBENA, Fr. *Verveine*, Eng. *Vervain*.

- P. 4. ♂ + c. 1. Amer. altiss. fl. Cæruleo, R. 2. L. 10. M. 4.
P. 1. ♂ + f. 2. Fol. obtuse ovalibus spica carnosâ nuda, L. 2.
R. 6.
P. 2. ♂ a. 3. Canadensis urtici folio, R. 3. I. 11.

VERONICA, Fr. *Veronique*, Eng. *Speedwel*.

- P. 3. ♂ + a. { 1. Virg. altiss. spica multiplici fl. Candido, R. 1.
L. 1. M. 7.
2. . . . fol. Eleg. dentatis spica multi-
plici fl. Candido.
P. 1. ♂ + a. 3. Austriaca fol. magis dissectis fl. pulchro Cæ-
ruleo, M. 15. L. 13.
P. 1. ♂ + a. 4. Fol. oppositis dentatis fl. Cæruleo, L. 8.
5. Caule erecto fl. Cæruleo, L. 6.
P. 2. ♂ + a. { 6. . . . lanceolatis ternis fl. Cæruleo, L. 4.
7. latiore fl. Cæruleo, L. 4.
P. 1. ♂ + a. 8. . . . oppositis crenatis sub incanis fl. Cæruleo,
L. 5.

VIBURNUM.

- F. ♂ e. 1. Amer. urticae fol. non spinosa, *Lantana*, R. 1.
L. 3. fl. albo.
E. ♂ + e. { 2. fl. miniatis, *lantana*, R. 2. L. 4.
3. *lantana*, L. 4. fl. primo luteo
deinde purpureo.
F. ♂ + a. { 4. Fol. Cordato fl. albo, L. 5. M. 1.
5. Eleg. varieg. M. 2.
6. Amer.

Habitus

Culture

F. ♂ †

a.

6. Amer. aceris fol. fl. Cæruleo, L. 6.

E. ∞

c.

7. Salviæ fol. fl. Corymbosis, olim *Wachendorphia*,
Lantana, L. 6.

E. ♂ †

f.

8. Fol. ternis fl. Cæruleo spicato, *Lantana*, L. 1.VIOLEA, Fr. *Violette*, Eng. *Violet*.

P. 1. ♂

b.

1. Fruticosis, R. 1. L. 10.

P. ½. γ †

a.

2. Martia fl. purp. pleno. L. 8. γ.

VIRGA AUREA, Fr. *Verge dorée*, Eng. *Golden rod*.

P. 8. ∞ †

a.

1. Altiss. paniculis nonnunquam reflexo, B 5.
solidago, L. 3.

P. ½. ∞

a.

2. Omnium minimum, B. 14.

P. 2. ∞ †

a.

3. Mexicana limoni fol. B. 11. *solidago*, R. 1.
L. 6.

P. 3. ∞

a.

4. Montana latiore fol. glabro, B. 2. *solidago*,
R. 4.

P. 4. ∞ †

a.

5. Angusti fol. panicula speciosa, B. 6.

P. 2. ∞ †

a.

6. Minus fol. lato ferrato.

P. 3. ∞

a.

7. Fol. lato dentato Caule purpurascens.

VITEX, Fr. *Agnus*, Eng. *Chaste tree*.

A. 4. ∞ †

a.

{ 1. Fl. purpureis, R. 1. L. 1.
2. . . albo, B. 3. M. 3. L. 1.VITIS IDÆA, Fr. *Airelle*, Eng. *Bilberry*.

A. 4. ∞

c.

1. Africana fol. rotundo ferrato *Myrsine*, L. 1.
myrtus afr. fl. rubro.VITIS, Fr. *Vigne*, Eng. *Vine*.

V.

a.

1. Quinque fol. Canadensis, M. 5. R. 3. *bedera*,
L. 3.

V. ∞

a.

{ 2. Fol. apii, vinifera, R. 2. L. 6.
3. Virg. vinifera fol. Cordatis, L. 4.

VOLKAMERIA.

E.

f. a.

1. Spinis petiolorum rudimentis, L. 1.

F. ∞ †

f. e.

2. Inermis, L. 2. fl. albicante tubiformi *Elegans*.

W A

Habitus Culture

WACHENDORPHIA.

P. 3. m + d. * 1. Afr. palmæ fol. fl. amplissimo, aureo.

Y U C C A.

F. m + b. 1. Fol. alœs, L. 1. M. 1. Cordyline, R. 3.

F. m + c. 2. margine Crenulato, L. 2. M. 3.
Cordyline, R. 1. aloë, B. 11.

P. 4. m + b. 3. filamentosis, L. 4. M. 2.

ZANTOXYLON, Eng. Tooth-ach tree.

A. 4. 2. 1. Spinosum fol. pinnatis, M. 1. L. 1.

A N O N Y M Æ.

F. f. o. x. Arbor americana Carica similis.

F. f. o. x. An Jasminum malabaricum, Genipa, ou Comme
il a ete autrefois cité an apocynum fol.
ternis.

140
On trouve aussi chez nous Les plus exquisite Espe-
ces des Vignes suivantes.

Blanches,	Vander Laan.	f I	10
	Vosholse.	f I	10
	Diamant.	f I	10
	Parel druyf.	f I	10
	Geel rand, raamborger wit.	f I	10
	Vaste Waterzoet.	f I	
	Losse lypfiger.	f I	
	Muscadelle.	f I	
Bleues,	Lange franquendaler.	f I	
	Ronde franquendaler.	f I	
	Vin tinct.	f I	
	Bleue avant.	f I	
	Catalonier.	f I	10
	Parel druyf.	f I	
	Muscadelle.	f I	

Comme aussi des Racines d'asperges du meilleur
especes.

d'Une année le Centaine	f I	5
De deux années le Centaine	f I	10

Et d'ailleurs une tres grande Collection de Semen-
ces à fleurs ou des plantes annuelle des quelles
on peut avoir un Catalogue separate.

VER-

V E R K L A R I N G

*Der Letteren en Teken en staande op de eerste Co-
lomme, te kennen gevende de hoedanig-
heden der gewassen.*

- A. 1. Betekent, Bomen welke tot de grootste hoog-
te opschiete.
- A. 2. . . . Bomen van de tweede hoogte.
- A. 3. . . . Bomen van de derde hoogte.
- A. 4. . . . Bomen van de vierde hoogte, of
zulke die 't laagst wassen.
- F. . . . Heesters, of struclagtige gewassen.
- P. $\frac{1}{2}$ Planten welker bloemstenge of ge-
was maar omtrent $\frac{1}{2}$ voet hoog opschiete.
- P. 1. . . . Planten wier gewas tot omtrent
1 voet hoog werd.
- P. 2. } . . . Planten welker stengen tot 2. 3. 4.
P. 2. } of meer voeten ordinair opschieten.
P. 4. enz. }
- V. . . . Klimmende en zig omwindende
gewassen.
- B. $\frac{1}{2}$ Bol gewassen niet hoger dan een
halve voet wassende.
- B. 1. } . . . Bol gewassen wier stengen, tot
B. 2. enz. } 1. 2. enz. voet opschiete.
- R. $\frac{1}{2}$ Wortel of klaauw gewassen, tot
6 duym hoog groeyend.
- R. 1. } . . . Wortelagtige gewassen wier bloem-
R. 2. enz. } stengen of gewas tot 1. 2. enz. voeten hoog
gemeenlyk komen en haar gewaay des Win-
ters verliezen.

De Teken en der Dieren-riem geven ten naaften by
te kennen den tyd in welke zy bloeijen.

Zo betekent \approx Dat zy bloeijen, omtrent January.

χ	—	—	—	—	February.
γ	—	—	—	—	Maart.
δ	—	—	—	—	April.
Π	—	—	—	—	Mey.
Θ	—	—	—	—	Junio.
Ω	—	—	—	—	Julio.
μ	—	—	—	—	Augustus.
π	—	—	—	—	September.
m	—	—	—	—	October.
\rightarrow	—	—	—	—	November.
ψ	—	—	—	—	December.

$\Omega \rightarrow$ — van Junio tot November, enz.

♀ Doet kennen die gewassen, die 't grootste gedeelte
der Zomer Bloemen dragen, of wel 't gehele jaar door
nu en dan bloem geven.

† Betekent Gewassen, welke fraije en sierlyke Bloe-
men geven.

VER.

V E R K L A R I N ' G E

Der Letteren en Teken en der tweede Colomme te kennen gevende op hoedanige wyze behandelt, en 's winters kunnen bewaard werden.

- a. Geeft te kennen die gewassen welke zonder enige dekkinge onze winter koude verduuren en in vollen grond overblyven.
- b. - - - de zulke die in de koude grond overblyven, dog des Winters, met stro, matten, of droge boom bladeren moeten gedekt worden.
- c. - - - die gene die in een ordinair Orange huys, kamer of ander vertrek kunnen werden bewaard, alleen maar zorg dragende dat niet bevroren.
- d. - - - die ingelyks in een bovengemeld vertrek kunnen overwinteren, dog dicht voor de glazen moeten werden gestelt, of op een plaats daar de zon en versse lugt genieten kunnen.
- e. - - - die in een kas in welke des winters een weinig gestookt werd, moeten werden bewaard
- f. - - - die in een kas gehouden, en gelyke warmte als de Annanasten genieten moeten.
- g. - - - die gene die wel de grootste warmte vereisen.
- o. - - - die 'tgehele jaar binnen de bakken of kassen eisen gehouden te warden, also ons Cimaat niet verdragen.
- x. - - - die in het voorjaar op den broeybak moeten gestelt en aan den groey gebragt werden.
- f. - - - die des winters zeer weinig water moeten gegeven werden.
- ff. - - - dezulke welke in 'tgeheel des winters geen water behoeven te ontfangen.
- *. - - - africaanse bollen of planten, welke in den vollen gront geplant, en des winters met glasramen gedekt zynde en voor alle vorst bewaard werdende, veel gewilliger bloeijen als dat dezelve in potten geplant, en des winters in 't Oranje huys bewaard werden.

De

114
De letteren agter de benaminge der Planten, geven te
kennen de Autheurs by welke dezelve op de daar
bygevoegde nummers zyn te vinden.

Als B. Boerhaven, index alter plantarum, lugduni batav.
1720.

R. A. van Roijen, flora Leydensis prodromus lugduni
batav. 1740.

L. C. Linnæi, species plantarum holmiæ, 1753.

M. P. Miller gardeners, dictionary fixt edition London,
1752.

T. Z. J. Burmanni, thesaurus Zeylanicus, Amstelædami,
1737.

B. D. J. Burmanni, decades plantarum africanarum, amste-
lædami, 1733.

T. Tournefort, institutiones rei herbariæ, paris, 1719.

C. C. Commelinus, icones plantarum lug. batav. 1716.

C. H. Horti Cliffortiani.


*Parceque plusieurs Amateurs des Pais Etrangeres se mepren-
dre ~~sur~~ quelques fois touchant le temps du transport; nous
avons jugé à propos d'y joindre une petite direction,
à l'égard du temps le plus propre pour transporter les
Plantes.*

Les Arbres se depouillent & le pluspart des Plantes de pleine
terre, doivent être transportées, pendant les Mois de Février ou
Mars, en Printemps, ou aux Mois d'Octobre & Novembre
dans l'Automne.

Les Arbres & Plantes des Serres doivent être transportées
aux Mois d'Avril, May ou Septembre.


Les Oignons pendant les Mois d'Aout, Septembre & No-
vembre suivant l'étendue du Chemin.

7



Rava/S







8Bf 3375²



Technische Universität Berlin
Universitätsbibliothek im Volkswagen-Haus



+
x-rite



+
colorchecker CLASSIC

100mm